

Les estimations obtenues à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en oeuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour minimiser ce type d'erreur pendant la mise en oeuvre de l'EDSBF-III, il est difficile d'éviter et d'évaluer toutes les erreurs de mesure.

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. L'échantillon sélectionné pour l'EDSBF-III n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement choisi. L'erreur de sondage est une mesure de cette variabilité entre tous les échantillons possibles. Bien que cette variabilité ne peut pas être mesurée exactement, elle peut être estimée cependant, à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur de sondage d'un paramètre (moyenne, proportion ou taux), elle est la racine carrée de la variance du paramètre. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels nous considérons se trouver la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance. Par exemple, la vraie valeur d'un paramètre se trouve dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois de son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95 %.

Si l'échantillon avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer les erreurs de sondage. Cependant, l'échantillon de l'EDSBF-III étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, des formules plus complexes ont été utilisées. Le module « erreurs de sondage » du logiciel ISSA a été utilisé pour calculer les erreurs de sondage suivant la méthodologie statistique appropriée. Ce module utilise la méthode de linéarisation (Taylor) pour des estimations telles que les moyennes ou proportions, et la méthode de Jackknife pour des estimations plus complexes tels que l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r = y/x$, avec y la valeur du paramètre pour l'échantillon total, et x le nombre total de cas dans l'ensemble (ou sous-ensemble) de l'échantillon. La variance de r est estimée par :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_{h-1}} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

où h représente la strate qui va de 1 à H ,
 m_h est le nombre total de grappes tirées dans la strate h ,
 y_{hi} est la somme des valeurs pondérées du paramètre y dans la grappe i de la strate h ,
 x_{hi} est la somme des nombres pondérés de cas dans la grappe i de la strate h , et

f est le taux global de sondage qui est négligeable.

La méthode de Jackknife dérive les estimations des taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal, et calcule les variances de ces estimations avec des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans les calculs des estimations. Ainsi, des sous-échantillons pseudo-indépendants ont été créés. Dans l'EDSBF-III, il y a 400 grappes non-vides. Par conséquent, 400 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculée de la façon suivante :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon principal de 400 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 399 grappes
($i^{\text{ème}}$ grappe exclue),
 k est le nombre total de grappes.

Il existe un deuxième indice très utile qui est la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) ou effet de grappe : c'est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Cet indice révèle dans quelle mesure le plan de sondage qui a été choisi se rapproche d'un échantillon aléatoire simple de même taille : la valeur 1 de la REPS indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un échantillon aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1 indique un accroissement de l'erreur de sondage dû à un plan de sondage plus complexe et moins efficace au point de vue statistique. Le logiciel calcule aussi l'erreur relative et l'intervalle de confiance pour chaque estimation.

Les erreurs de sondage pour l'EDSBF-III ont été calculées pour certaines des variables les plus pertinentes. Les résultats sont présentés dans cette annexe pour l'ensemble du pays, le milieu urbain, le milieu rural et les treize régions administratives. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion ou taux) et la population de base sont présentés dans le tableau B.1. Les tableaux B.2 à B.17 présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non-pondérés (N) et pondérés (N'), la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95 % ($M \pm 2ET$) pour chaque variable. L'effet du plan de sondage (REPS) est non-défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1). Dans le cas de l'indice synthétique de fécondité, le nombre de cas non-pondérés n'est pas pertinent, car la valeur non-pondérée de femmes-années d'exposition au risque de grossesse n'est pas connue.

L'intervalle de confiance est interprété de la manière suivante : pour la variable *Enfants nés vivants*, l'EDSBF-III a donné un nombre moyen d'enfants nés vivants de 3,308 pour l'ensemble des femmes, auquel correspond une erreur-type de 0,037 enfants. Dans 95 % des échantillons de taille et caractéristique identiques, la valeur réelle du nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes âgées de 15 à 49 ans se trouve entre $3,308 - 2 \times 0,037$ et $3,308 + 2 \times 0,037$, soit 3,234 et 3,381.

Les erreurs de sondage ont été analysées pour l'échantillon national de femmes et pour deux groupes d'estimations : (1) moyennes et proportions, et (2) taux démographiques. Les erreurs relatives (ET/M) des moyennes et proportions se situent entre 0,6 % et 32,6 % avec une moyenne de 4,8 %. Les erreurs relatives les plus élevées sont généralement celles des estimations de très faible valeur (par

exemple, parmi les femmes actuellement en union qui *Utilise actuellement la stérilisation féminine*). Si on enlève les estimations de très faible valeur (moins de 10 %), la moyenne tombe à 3,0 %. Ainsi, en général, les erreurs relatives de la plupart des estimations pour l'ensemble du pays sont faibles, sauf dans le cas de très faibles proportions. L'erreur relative de l'indice de fécondité est assez faible 2,1 %. Cependant, pour les taux de mortalité, l'erreur relative moyenne est plus élevée 4,9 %.

Il existe des différences entre les erreurs relatives au niveau des sous-échantillons. Par exemple, pour la variable *Enfants nés vivants des femmes âgées de 40 à 49 ans*, l'erreur relative pour l'échantillon de femmes est respectivement de 1,1 %, 2,7 % et 3,6 % pour l'ensemble du pays, le milieu urbain et le Centre-Nord.

Pour l'échantillon national de femmes, la moyenne de la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) calculée pour l'ensemble des estimations est de 1,71 ce qui veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur de sondage est multipliée en moyenne par un facteur de 1,71 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappes et à plusieurs degrés) et moins efficace.

Tableau B.1 Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Estimation	Population de base
FEMMES		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Milieu urbain Alphabétisées	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Sans instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Instruction post-primaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	Proportion	Tous les enfants 7-12
Jamais mariée (en union)	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Actuellement mariée (en union)	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Mariée (en union) avant 20 ans	Proportion	Femmes 20-49
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Enfants nés vivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Enfants nés vivants des femmes 40-49	Moyenne	Femmes 40-49
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
A utilisé une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement le condom	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise actuellement la continence périodique	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Utilise source publique	Proportion	Utilisatrices de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfants	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Veut retarder d'au moins 2 ans	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49
Taille de famille idéale	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Mères reçu injection antitétanique (dernière naissance)	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
A reçu traitement SRO	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
A consulté du personnel médical	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Ayant un carnet de santé, vue	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination BCG	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination DTC (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination rougeole	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
Vacciné contre toutes les maladies	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
Poids pour taille (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 3 ans
Taille pour âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 3 ans
Poids pour âge (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 3 ans
Anémie chez les enfants	Proportion	Enfants de 6-59 mois
Anémie chez les femmes	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Indice de masse corporelle sous 18,5	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Prévalence de VIH	Taux	Toutes les femmes 15-49 testées
HOMMES		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-59
Sans instruction	Proportion	Tous les hommes 15-59
Instruction post-primaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-59
Jamais mariée (en union)	Proportion	Tous les hommes 15-59
Actuellement mariée (en union)	Proportion	Tous les hommes 15-59
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Connaît une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
A utilisé une méthode	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise actuellement les injections	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise actuellement le condom	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Utilise la continence périodique	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Ne veut plus d'enfants	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Veut retarder d'au moins 2 ans	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-59
Taille de famille idéale	Moyenne	Tous les hommes 15-59
Prévalence de VIH (15-49)	Taux	Tous les hommes 15-49 testés
Prévalence de VIH (15-59)	Taux	Tous les hommes 15-59 testés

Tableau B.2 Erreurs de sondage - Echantillon national, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,216	0,012	12477	12477	3,229	0,055	0,192	0,240
Alphabétisée	0,159	0,009	12477	12477	2,617	0,054	0,142	0,176
Sans instruction	0,803	0,009	12477	12477	2,573	0,011	0,784	0,821
Instruction post-primaire ou plus	0,087	0,006	12477	12477	2,439	0,071	0,075	0,099
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,318	0,012	11348	10963	2,079	0,037	0,294	0,341
Jamais mariée (en union)	0,187	0,006	12477	12477	1,729	0,032	0,175	0,199
Actuellement mariée (en union)	0,774	0,007	12477	12477	1,847	0,009	0,760	0,788
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,807	0,008	9700	9701	2,047	0,010	0,791	0,824
Actuellement enceinte	0,105	0,003	12477	12477	1,231	0,032	0,098	0,112
Enfants nés vivants	3,308	0,037	12477	12477	1,369	0,011	3,234	3,381
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,917	0,076	2334	2250	1,399	0,011	6,765	7,070
Enfants survivants	2,635	0,028	12477	12477	1,315	0,011	2,579	2,691
Connaît une méthode contraceptive	0,917	0,005	9537	9655	1,889	0,006	0,906	0,927
A utilisé une méthode	0,296	0,011	9537	9655	2,265	0,036	0,275	0,317
Utilise actuellement une méthode	0,138	0,006	9537	9655	1,769	0,045	0,125	0,150
Utilise actuellement la pilule	0,022	0,002	9537	9655	1,539	0,105	0,017	0,027
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,001	9537	9655	1,178	0,180	0,003	0,006
Utilise actuellement le condom	0,021	0,002	9537	9655	1,097	0,076	0,018	0,024
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,000	9537	9655	0,968	0,326	0,000	0,002
Utilise actuellement la continence périodique	0,031	0,002	9537	9655	1,339	0,077	0,026	0,036
Utilise une source du secteur publique	0,539	0,027	1283	1212	1,967	0,051	0,484	0,593
Ne veut plus d'enfants	0,230	0,006	9537	9655	1,340	0,025	0,219	0,242
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,466	0,008	9537	9655	1,491	0,016	0,450	0,481
Nombre d'enfants idéal	5,562	0,045	11760	11850	2,149	0,008	5,473	5,652
Mères reçu injection antitétanique	0,645	0,010	7367	7428	1,855	0,016	0,625	0,666
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,564	0,018	10645	10852	2,992	0,031	0,529	0,600
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,207	0,007	9365	9477	1,705	0,036	0,192	0,222
A reçu le traitement SRO	0,189	0,012	1876	1961	1,320	0,065	0,164	0,213
A consulté du personnel médical	0,172	0,012	1876	1961	1,363	0,070	0,148	0,196
Ayant un carnet de santé, vue	0,667	0,022	1824	1840	1,969	0,033	0,624	0,711
A reçu vaccination BCG	0,809	0,021	1824	1840	2,310	0,026	0,767	0,852
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,570	0,022	1824	1840	1,871	0,038	0,527	0,614
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,587	0,022	1824	1840	1,909	0,038	0,542	0,631
A reçu vaccination rougeole	0,558	0,021	1824	1840	1,833	0,038	0,516	0,601
Vacciné contre toutes les maladies	0,439	0,020	1824	1840	1,697	0,045	0,399	0,478
Poids pour taille (-2ET)	0,186	0,007	8487	8628	1,473	0,035	0,173	0,199
Taille pour âge (-2ET)	0,387	0,009	8487	8628	1,602	0,023	0,370	0,405
Poids pour âge (-2ET)	0,377	0,009	8487	8628	1,563	0,023	0,359	0,394
Anémie chez les enfants	0,915	0,007	2744	2787	1,266	0,008	0,901	0,929
Anémie chez les femmes	0,537	0,009	4211	4271	1,245	0,018	0,518	0,556
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,208	0,007	10673	10604	1,690	0,032	0,195	0,221
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,237	0,132	na	55115	2,195	0,021	5,973	6,501
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans)	31,002	2,311	10717	10937	1,350	0,075	26,381	35,623
Quotient de mortalité post-néonatale (0-4 ans)	50,387	3,112	10748	10964	1,436	0,062	44,163	56,610
Quotient de mortalité infantile (0-4 ans)	81,389	3,802	10750	10969	1,365	0,047	73,784	88,994
Quotient de mortalité infantile (5-9 ans)	103,048	3,887	10648	10632	1,167	0,038	95,274	110,823
Quotient de mortalité infantile (10-14 ans)	92,869	4,138	8339	8192	1,218	0,045	84,593	101,144
Quotient de mortalité juvénile (0-4 ans)	111,424	4,917	11101	11357	1,432	0,044	101,591	121,257
Quotient de mortalité infanto-juvénile (0-4 ans)	183,744	6,460	11136	11392	1,586	0,035	170,825	196,664
Prévalence VIH	0,018	0,003	4189	4086	1,338	0,152	0,013	0,024
HOMMES								
Milieu urbain	0,241	0,012	3605	3605	1,687	0,050	0,217	0,265
Sans instruction	0,652	0,015	3605	3605	1,923	0,023	0,621	0,682
Instruction post-primaire ou plus	0,169	0,012	3605	3605	1,983	0,073	0,144	0,193
Jamais mariée (en union)	0,423	0,011	3605	3605	1,331	0,026	0,401	0,445
Actuellement mariée (en union)	0,559	0,010	3605	3605	1,258	0,019	0,538	0,580
Connaît une méthode contraceptive	0,956	0,005	1973	2016	1,104	0,005	0,946	0,966
Connaît une méthode moderne	0,933	0,007	1973	2016	1,202	0,007	0,919	0,946
A utilisé une méthode	0,555	0,016	1973	2016	1,452	0,029	0,523	0,588
Utilise actuellement une méthode	0,372	0,016	1973	2016	1,460	0,043	0,340	0,404
Utilise actuellement une méthode moderne	0,218	0,012	1973	2016	1,268	0,054	0,195	0,242
Utilise actuellement la pilule	0,048	0,006	1973	2016	1,222	0,123	0,036	0,060
Utilise actuellement les injections	0,021	0,004	1973	2016	1,141	0,174	0,014	0,029
Utilise actuellement le condom	0,129	0,008	1973	2016	1,111	0,065	0,112	0,146
Utilise actuellement la continence périodique	0,104	0,009	1973	2016	1,274	0,084	0,087	0,122
Ne veut plus d'enfants	0,140	0,010	1973	2016	1,263	0,070	0,121	0,160
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,496	0,012	1973	2016	1,059	0,024	0,472	0,520
Nombre d'enfants idéal	6,349	0,119	3196	3216	1,471	0,019	6,110	6,588
Prévalence VIH (15-49)	0,019	0,003	2954	3065	1,347	0,180	0,012	0,025
Prévalence VIH (15-59)	0,019	0,003	3341	3429	1,290	0,158	0,013	0,026

na = Non-applicable

Tableau B.3 Erreurs de sondage - Echantillon urbain, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	3014	2697	na	0,000	1,000	1,000
Alphabétisée	0,527	0,016	3014	2697	1,751	0,030	0,496	0,559
Sans instruction	0,406	0,016	3014	2697	1,738	0,038	0,375	0,437
Instruction post-primaire ou plus	0,337	0,018	3014	2697	2,059	0,053	0,301	0,372
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,761	0,020	1955	1491	1,587	0,027	0,720	0,802
Jamais mariée (en union)	0,378	0,014	3014	2697	1,640	0,038	0,349	0,407
Actuellement mariée (en union)	0,544	0,016	3014	2697	1,730	0,029	0,513	0,576
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,540	0,023	2162	1932	2,159	0,043	0,494	0,587
Actuellement enceinte	0,065	0,005	3014	2697	1,176	0,081	0,055	0,076
Enfants nés vivants	2,092	0,052	3014	2697	1,127	0,025	1,988	2,195
Enfants nés vivants des femmes 40-49	5,810	0,157	421	374	1,214	0,027	5,495	6,125
Enfants survivants	1,767	0,040	3014	2697	1,041	0,023	1,687	1,848
Connaît une méthode contraceptive	0,988	0,003	1720	1468	0,987	0,003	0,983	0,993
A utilisé une méthode	0,661	0,024	1720	1468	2,120	0,037	0,612	0,709
Utilise actuellement une méthode	0,342	0,019	1720	1468	1,689	0,056	0,303	0,381
Utilise actuellement la pilule	0,089	0,010	1720	1468	1,458	0,112	0,069	0,109
Utilise actuellement le DIU	0,023	0,004	1720	1468	1,103	0,174	0,015	0,031
Utilise actuellement le condom	0,070	0,008	1720	1468	1,300	0,114	0,054	0,086
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,001	1720	1468	0,768	0,427	0,000	0,003
Utilise actuellement la continence périodique	0,051	0,007	1720	1468	1,312	0,136	0,037	0,065
Utilise une source du secteur publique	0,464	0,039	799	702	2,212	0,084	0,386	0,543
Ne veut plus d'enfants	0,266	0,011	1720	1468	1,037	0,042	0,244	0,289
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,380	0,018	1720	1468	1,520	0,047	0,344	0,415
Nombre d'enfants idéal	4,160	0,057	2869	2562	1,842	0,014	4,046	4,274
Mères reçu injection antitétanique	0,818	0,013	1301	1055	1,146	0,016	0,792	0,844
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,908	0,014	1721	1386	1,599	0,015	0,880	0,936
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,211	0,018	1561	1261	1,639	0,087	0,175	0,248
A reçu le traitement SRO	0,247	0,028	309	266	1,076	0,112	0,192	0,303
A consulté du personnel médical	0,317	0,036	309	266	1,290	0,115	0,244	0,390
Ayant un carnet de santé, vue	0,822	0,028	314	233	1,165	0,034	0,766	0,878
A reçu vaccination BCG	0,965	0,015	314	233	1,296	0,015	0,936	0,995
A reçu vaccination DTCog (3 doses)	0,725	0,033	314	233	1,188	0,045	0,659	0,791
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,734	0,036	314	233	1,283	0,048	0,663	0,805
A reçu vaccination rougeole	0,731	0,034	314	233	1,224	0,046	0,663	0,798
Vacciné contre toutes les maladies	0,620	0,037	314	233	1,212	0,059	0,547	0,694
Poids pour taille (-2ET)	0,124	0,011	1442	1149	1,177	0,088	0,102	0,146
Taille pour âge (-2ET)	0,202	0,014	1442	1149	1,223	0,069	0,174	0,230
Poids pour âge (-2ET)	0,205	0,014	1442	1149	1,263	0,068	0,177	0,233
Anémie chez les enfants	0,758	0,033	413	323	1,397	0,044	0,691	0,825
Anémie chez les femmes	0,507	0,022	950	866	1,370	0,043	0,463	0,551
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,088	0,007	2659	2365	1,210	0,076	0,075	0,101
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	3,744	0,195	na	11571	2,077	0,052	3,353	4,134
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	34,614	6,376	3334	2704	1,671	0,184	21,861	47,366
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	35,604	4,207	3339	2708	1,190	0,118	27,191	44,018
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	70,218	7,137	3339	2708	1,406	0,102	55,943	84,492
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	71,233	6,752	3380	2737	1,302	0,095	57,730	84,737
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	136,449	10,527	3385	2740	1,581	0,077	115,395	157,503
Prévalence VIH	0,040	0,011	936	930	1,732	0,277	0,018	0,062
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	922	867	na	0,000	1,000	1,000
Sans instruction	0,253	0,027	922	867	1,879	0,106	0,199	0,307
Instruction post-primaire ou plus	0,512	0,032	922	867	1,914	0,062	0,449	0,575
Jamais mariée (en union)	0,543	0,023	922	867	1,386	0,042	0,498	0,589
Actuellement mariée (en union)	0,434	0,019	922	867	1,190	0,045	0,395	0,473
Connaît une méthode contraceptive	0,985	0,007	399	377	1,184	0,007	0,971	0,999
Connaît une méthode moderne	0,985	0,007	399	377	1,184	0,007	0,971	0,999
A utilisé une méthode	0,784	0,031	399	377	1,508	0,040	0,722	0,846
Utilise actuellement une méthode	0,505	0,025	399	377	1,004	0,050	0,455	0,555
Utilise actuellement une méthode moderne	0,380	0,026	399	377	1,068	0,068	0,328	0,432
Utilise actuellement la pilule	0,117	0,017	399	377	1,056	0,146	0,083	0,150
Utilise actuellement les injections	0,027	0,007	399	377	0,809	0,242	0,014	0,041
Utilise actuellement le condom	0,172	0,018	399	377	0,948	0,104	0,136	0,208
Utilise actuellement la continence périodique	0,104	0,021	399	377	1,343	0,198	0,063	0,145
Ne veut plus d'enfants	0,289	0,030	399	377	1,315	0,103	0,230	0,349
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,363	0,027	399	377	1,114	0,074	0,309	0,417
Nombre d'enfants idéal	4,136	0,106	857	822	1,290	0,026	3,924	4,348
Prévalence VIH (15-49)	0,032	0,009	709	778	1,318	0,273	0,015	0,049
Prévalence VIH (15-59)	0,038	0,008	767	827	1,225	0,223	0,021	0,055

na = Non-applicable

Tableau B.4 Erreurs de sondage - Echantillon rural, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	9463	9780	na	na	0,000	0,000
Alphabétisée	0,058	0,006	9463	9780	2,538	0,105	0,046	0,070
Sans instruction	0,912	0,007	9463	9780	2,417	0,008	0,898	0,926
Instruction post-primaire ou plus	0,018	0,003	9463	9780	2,546	0,193	0,011	0,025
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,248	0,013	9393	9472	2,253	0,050	0,223	0,273
Jamais mariée (en union)	0,135	0,005	9463	9780	1,536	0,040	0,124	0,145
Actuellement mariée (en union)	0,837	0,006	9463	9780	1,561	0,007	0,825	0,849
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,874	0,006	7538	7768	1,578	0,007	0,862	0,886
Actuellement enceinte	0,116	0,004	9463	9780	1,192	0,034	0,108	0,124
Enfants nés vivants	3,643	0,039	9463	9780	1,263	0,011	3,565	3,721
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,138	0,081	1913	1875	1,385	0,011	6,976	7,301
Enfants survivants	2,875	0,031	9463	9780	1,245	0,011	2,813	2,936
Connaît une méthode contraceptive	0,904	0,006	7817	8187	1,852	0,007	0,892	0,916
A utilisé une méthode	0,231	0,010	7817	8187	2,053	0,042	0,211	0,250
Utilise actuellement une méthode	0,101	0,006	7817	8187	1,672	0,056	0,090	0,113
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,002	7817	8187	1,530	0,173	0,007	0,013
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	7817	8187	1,332	0,439	0,000	0,002
Utilise actuellement le condom	0,012	0,001	7817	8187	1,073	0,108	0,010	0,015
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,000	7817	8187	1,048	0,431	0,000	0,001
Utilise actuellement la continence périodique	0,027	0,002	7817	8187	1,340	0,091	0,022	0,032
Utilise une source du secteur publique	0,641	0,034	484	510	1,576	0,054	0,572	0,710
Ne veut plus d'enfants	0,224	0,006	7817	8187	1,367	0,029	0,211	0,237
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,481	0,008	7817	8187	1,458	0,017	0,465	0,498
Nombre d'enfants idéal	5,949	0,045	8891	9288	1,901	0,008	5,859	6,039
Mères reçu injection antitétanique	0,616	0,012	6066	6372	1,881	0,019	0,593	0,640
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,514	0,020	8924	9466	3,032	0,038	0,475	0,553
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,206	0,008	7804	8217	1,700	0,039	0,190	0,222
A reçu le traitement SRO	0,179	0,013	1567	1694	1,344	0,075	0,152	0,206
A consulté du personnel médical	0,149	0,012	1567	1694	1,331	0,082	0,125	0,173
Ayant un carnet de santé, vue	0,645	0,024	1510	1606	1,979	0,037	0,596	0,693
A reçu vaccination BCG	0,787	0,024	1510	1606	2,286	0,030	0,739	0,835
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,548	0,024	1510	1606	1,895	0,044	0,500	0,596
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,565	0,024	1510	1606	1,928	0,043	0,516	0,614
A reçu vaccination rougeole	0,533	0,024	1510	1606	1,849	0,044	0,486	0,580
Vacciné contre toutes les maladies	0,412	0,022	1510	1606	1,715	0,052	0,369	0,456
Poids pour taille (-2ET)	0,196	0,007	7045	7479	1,480	0,037	0,181	0,210
Taille pour âge (-2ET)	0,416	0,010	7045	7479	1,597	0,024	0,396	0,436
Poids pour âge (-2ET)	0,403	0,010	7045	7479	1,561	0,024	0,384	0,422
Anémie chez les enfants	0,936	0,006	2331	2465	1,202	0,006	0,923	0,948
Anémie chez les femmes	0,545	0,010	3261	3404	1,197	0,019	0,524	0,566
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,242	0,008	8014	8239	1,697	0,034	0,226	0,259
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,865	0,103	na	43543	1,543	0,015	6,658	7,072
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	39,329	2,120	17979	18812	1,332	0,054	35,090	43,568
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	55,943	2,406	18024	18857	1,305	0,043	51,130	60,755
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	95,272	3,367	18026	18862	1,375	0,035	88,538	102,006
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	117,438	4,310	18300	19142	1,412	0,037	108,817	126,058
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	201,521	5,569	18349	19196	1,592	0,028	190,382	212,660
Prévalence VIH	0,012	0,002	3253	3156	0,974	0,156	0,008	0,016
HOMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	2683	2738	na	na	0,000	0,000
Sans instruction	0,778	0,016	2683	2738	1,938	0,020	0,747	0,809
Instruction post-primaire ou plus	0,060	0,010	2683	2738	2,129	0,163	0,040	0,079
Jamais mariée (en union)	0,385	0,013	2683	2738	1,350	0,033	0,359	0,410
Actuellement mariée (en union)	0,599	0,012	2683	2738	1,309	0,021	0,574	0,623
Connaît une méthode contraceptive	0,949	0,006	1574	1639	1,096	0,006	0,937	0,961
Connaît une méthode moderne	0,921	0,008	1574	1639	1,192	0,009	0,904	0,937
A utilisé une méthode	0,502	0,018	1574	1639	1,451	0,036	0,466	0,539
Utilise actuellement une méthode	0,341	0,019	1574	1639	1,575	0,055	0,304	0,379
Utilise actuellement une méthode moderne	0,181	0,014	1574	1639	1,394	0,075	0,154	0,208
Utilise actuellement la pilule	0,032	0,006	1574	1639	1,373	0,191	0,020	0,044
Utilise actuellement les injections	0,020	0,004	1574	1639	1,222	0,215	0,011	0,029
Utilise actuellement le condom	0,119	0,010	1574	1639	1,171	0,080	0,100	0,139
Utilise actuellement la continence périodique	0,105	0,010	1574	1639	1,258	0,093	0,085	0,124
Ne veut plus d'enfants	0,106	0,009	1574	1639	1,197	0,088	0,088	0,125
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,526	0,013	1574	1639	1,004	0,024	0,501	0,552
Nombre d'enfants idéal	7,108	0,151	2339	2395	1,487	0,021	6,806	7,410
Prévalence VIH (15-49)	0,014	0,003	2245	2287	1,317	0,233	0,008	0,021
Prévalence VIH (15-59)	0,014	0,003	2574	2602	1,282	0,215	0,008	0,020

na = Non-applicable

Tableau B.5 Erreurs de sondage - Echantillon Boucle du Mouhoun, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,107	0,023	921	910	2,212	0,210	0,062	0,152
Alphabétisée	0,120	0,022	921	910	2,086	0,187	0,075	0,164
Sans instruction	0,837	0,024	921	910	1,981	0,029	0,789	0,885
Instruction post-primaire ou plus	0,050	0,015	921	910	2,124	0,307	0,019	0,080
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,306	0,042	965	982	2,314	0,137	0,222	0,389
Jamais mariée (en union)	0,178	0,019	921	910	1,469	0,104	0,141	0,215
Actuellement mariée (en union)	0,801	0,021	921	910	1,622	0,027	0,759	0,844
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,858	0,019	725	736	1,473	0,022	0,820	0,896
Actuellement enceinte	0,104	0,011	921	910	1,052	0,102	0,083	0,125
Enfants nés vivants	4,231	0,125	921	910	1,161	0,029	3,981	4,480
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,670	0,186	217	218	1,194	0,024	7,298	8,042
Enfants survivants	3,354	0,106	921	910	1,226	0,032	3,142	3,566
Connaît une méthode contraceptive	0,981	0,008	712	729	1,510	0,008	0,965	0,996
A utilisé une méthode	0,271	0,042	712	729	2,518	0,155	0,187	0,354
Utilise actuellement une méthode	0,130	0,024	712	729	1,919	0,186	0,082	0,179
Utilise actuellement la pilule	0,015	0,006	712	729	1,397	0,424	0,002	0,028
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,002	712	729	1,068	0,700	0,000	0,008
Utilise actuellement le condom	0,016	0,005	712	729	0,994	0,289	0,007	0,026
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	712	729	0,938	0,974	0,000	0,004
Utilise actuellement la continence périodique	0,017	0,006	712	729	1,227	0,350	0,005	0,029
Utilise une source du secteur publique	0,700	0,060	114	98	1,383	0,085	0,580	0,819
Ne veut plus d'enfants	0,333	0,026	712	729	1,471	0,078	0,281	0,385
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,407	0,023	712	729	1,256	0,057	0,361	0,453
Nombre d'enfants idéal	5,535	0,134	881	869	2,008	0,024	5,267	5,803
Mères reçurent injection antitétanique	0,628	0,044	532	548	2,134	0,070	0,541	0,716
Mères reçurent assistance médicale à l'accouchement	0,538	0,073	802	836	3,308	0,136	0,391	0,684
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,190	0,013	711	743	0,815	0,066	0,165	0,215
A reçu le traitement SRO	0,153	0,028	136	141	0,870	0,184	0,097	0,209
A consulté du personnel médical	0,174	0,031	136	141	0,947	0,179	0,112	0,236
Ayant un carnet de santé, vue	0,830	0,038	152	161	1,281	0,046	0,754	0,905
A reçu vaccination BCG	0,919	0,029	152	161	1,368	0,032	0,860	0,978
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,636	0,054	152	161	1,429	0,085	0,528	0,744
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,664	0,060	152	161	1,625	0,091	0,544	0,785
A reçu vaccination rougeole	0,602	0,064	152	161	1,674	0,107	0,474	0,731
Vacciné contre toutes les maladies	0,501	0,065	152	161	1,655	0,130	0,371	0,630
Poids pour taille (-2ET)	0,251	0,024	670	699	1,401	0,097	0,202	0,300
Taille pour âge (-2ET)	0,340	0,021	670	699	1,128	0,061	0,298	0,382
Poids pour âge (-2ET)	0,426	0,026	670	699	1,295	0,061	0,374	0,478
Anémie chez les enfants	0,970	0,013	215	231	1,172	0,014	0,944	0,997
Anémie chez les femmes	0,518	0,034	317	314	1,222	0,066	0,449	0,586
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,231	0,028	801	784	1,867	0,121	0,175	0,287
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,735	0,242	na	4043	1,332	0,036	6,250	7,220
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	31,731	5,239	1703	1769	1,131	0,165	21,253	42,210
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	56,514	6,423	1710	1778	1,099	0,114	43,668	69,360
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	88,245	8,145	1710	1778	1,121	0,092	71,954	104,536
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	109,636	13,243	1740	1804	1,622	0,121	83,150	136,122
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	188,206	17,259	1747	1813	1,699	0,092	153,688	222,725
Prévalence VIH	0,022	0,009	317	284	1,146	0,433	0,003	0,041
HOMMES								
Milieu urbain	0,081	0,013	274	277	0,765	0,157	0,055	0,106
Sans instruction	0,752	0,027	274	277	1,044	0,036	0,697	0,806
Instruction post-primaire ou plus	0,077	0,020	274	277	1,212	0,253	0,038	0,117
Jamais mariée (en union)	0,418	0,041	274	277	1,362	0,097	0,337	0,500
Actuellement mariée (en union)	0,566	0,042	274	277	1,405	0,075	0,481	0,650
Connaît une méthode contraceptive	0,995	0,005	145	157	0,837	0,005	0,986	1,000
Connaît une méthode moderne	0,959	0,015	145	157	0,908	0,016	0,929	0,989
A utilisé une méthode	0,597	0,039	145	157	0,960	0,066	0,519	0,676
Utilise actuellement une méthode	0,525	0,044	145	157	1,053	0,084	0,437	0,612
Utilise actuellement une méthode moderne	0,328	0,038	145	157	0,982	0,117	0,251	0,405
Utilise actuellement la pilule	0,052	0,019	145	157	1,010	0,360	0,015	0,089
Utilise actuellement les injections	0,019	0,009	145	157	0,815	0,484	0,001	0,038
Utilise actuellement le condom	0,225	0,032	145	157	0,917	0,142	0,161	0,289
Utilise actuellement la continence périodique	0,192	0,052	145	157	1,571	0,269	0,089	0,295
Ne veut plus d'enfants	0,191	0,033	145	157	1,008	0,173	0,125	0,258
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,445	0,034	145	157	0,819	0,076	0,377	0,513
Nombre d'enfants idéal	5,799	0,302	226	226	1,300	0,052	5,195	6,402
Prévalence VIH (15-49)	0,024	0,016	218	216	1,544	0,663	0,000	0,057
Prévalence VIH (15-59)	0,027	0,013	266	260	1,321	0,489	0,001	0,053

na = Non-applicable

Tableau B.6 Erreurs de sondage - Echantillon Centre, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,856	0,022	1040	1657	2,011	0,026	0,812	0,900
Alphabétisée	0,527	0,023	1040	1657	1,487	0,044	0,481	0,573
Sans instruction	0,409	0,022	1040	1657	1,432	0,053	0,365	0,452
Instruction post-primaire ou plus	0,340	0,026	1040	1657	1,752	0,076	0,289	0,392
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,741	0,029	683	898	1,367	0,040	0,683	0,800
Jamais mariée (en union)	0,378	0,022	1040	1657	1,492	0,059	0,333	0,423
Actuellement mariée (en union)	0,535	0,024	1040	1657	1,548	0,045	0,487	0,583
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,492	0,034	780	1208	1,876	0,068	0,425	0,560
Actuellement enceinte	0,061	0,007	1040	1657	0,936	0,114	0,047	0,074
Enfants nés vivants	2,072	0,077	1040	1657	1,011	0,037	1,918	2,227
Enfants nés vivants des femmes 40-49	5,517	0,215	172	245	1,097	0,039	5,087	5,947
Enfants survivants	1,743	0,062	1040	1657	0,962	0,035	1,620	1,866
Connait une méthode contraceptive	0,974	0,008	618	886	1,249	0,008	0,958	0,990
A utilisé une méthode	0,630	0,039	618	886	1,982	0,061	0,553	0,707
Utilise actuellement une méthode	0,321	0,030	618	886	1,585	0,093	0,262	0,381
Utilise actuellement la pilule	0,065	0,014	618	886	1,463	0,224	0,036	0,094
Utilise actuellement le DIU	0,033	0,006	618	886	0,872	0,190	0,020	0,045
Utilise actuellement le condom	0,073	0,012	618	886	1,114	0,159	0,050	0,097
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	618	886	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,061	0,011	618	886	1,133	0,179	0,039	0,083
Utilise une source du secteur publique	0,404	0,067	214	393	1,981	0,165	0,271	0,538
Ne veut plus d'enfants	0,262	0,015	618	886	0,859	0,058	0,231	0,292
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,364	0,028	618	886	1,430	0,076	0,308	0,419
Nombre d'enfants idéal	4,161	0,080	962	1546	1,509	0,019	4,001	4,322
Mères reçu injection antitétanique	0,789	0,018	444	612	0,851	0,022	0,754	0,825
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,934	0,018	617	827	1,423	0,019	0,898	0,969
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,244	0,025	565	752	1,245	0,103	0,193	0,294
A reçu le traitement SRO	0,223	0,043	141	183	1,111	0,192	0,137	0,308
A consulté du personnel médical	0,321	0,050	141	183	1,093	0,156	0,221	0,421
Ayant un carnet de santé, vue	0,814	0,041	110	135	0,961	0,050	0,733	0,896
A reçu vaccination BCG	0,952	0,026	110	135	1,106	0,027	0,900	1,000
A reçu vaccination DTCocq (3 doses)	0,722	0,057	110	135	1,175	0,079	0,607	0,837
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,742	0,059	110	135	1,245	0,080	0,623	0,861
A reçu vaccination rougeole	0,702	0,066	110	135	1,328	0,094	0,570	0,835
Vacciné contre toutes les maladies	0,630	0,065	110	135	1,240	0,104	0,499	0,760
Poids pour taille (-2ET)	0,127	0,017	508	672	1,079	0,135	0,093	0,161
Taille pour âge (-2ET)	0,202	0,024	508	672	1,143	0,117	0,155	0,249
Poids pour âge (-2ET)	0,211	0,027	508	672	1,329	0,128	0,157	0,265
Anémie chez les enfants	0,748	0,056	128	179	1,183	0,074	0,637	0,859
Anémie chez les femmes	0,469	0,031	316	530	1,119	0,065	0,408	0,531
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,085	0,007	881	1419	0,802	0,088	0,070	0,100
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	3,648	0,293	na	7147	1,797	0,080	3,063	4,234
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	39,605	10,175	1209	1633	1,453	0,257	19,256	59,955
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	32,829	6,234	1211	1635	1,031	0,190	20,361	45,297
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	72,434	11,828	1211	1635	1,288	0,163	48,777	96,091
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	58,877	9,081	1222	1650	1,178	0,154	40,714	77,040
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	127,047	17,079	1224	1652	1,580	0,134	92,888	161,205
Prévalence VIH	0,038	0,018	312	534	1,688	0,480	0,002	0,075
HOMMES								
Milieu urbain	0,865	0,019	323	537	0,994	0,022	0,827	0,903
Sans instruction	0,278	0,043	323	537	1,740	0,156	0,191	0,365
Instruction post-primaire ou plus	0,477	0,049	323	537	1,767	0,103	0,378	0,575
Jamais mariée (en union)	0,524	0,032	323	537	1,158	0,061	0,460	0,589
Actuellement mariée (en union)	0,452	0,024	323	537	0,870	0,053	0,403	0,500
Connait une méthode contraceptive	0,991	0,009	153	243	1,145	0,009	0,973	1,000
Connait une méthode moderne	0,991	0,009	153	243	1,145	0,009	0,973	1,000
A utilisé une méthode	0,772	0,044	153	243	1,306	0,058	0,683	0,861
Utilise actuellement une méthode	0,417	0,029	153	243	0,733	0,070	0,358	0,475
Utilise actuellement une méthode moderne	0,326	0,029	153	243	0,773	0,090	0,268	0,385
Utilise actuellement la pilule	0,087	0,022	153	243	0,946	0,249	0,044	0,130
Utilise actuellement les injections	0,004	0,003	153	243	0,595	0,752	0,000	0,010
Utilise actuellement le condom	0,171	0,021	153	243	0,703	0,125	0,128	0,214
Utilise actuellement la continence périodique	0,089	0,026	153	243	1,122	0,291	0,037	0,141
Ne veut plus d'enfants	0,281	0,042	153	243	1,143	0,148	0,198	0,364
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,367	0,041	153	243	1,054	0,112	0,285	0,450
Nombre d'enfants idéal	4,179	0,190	310	522	1,238	0,045	3,799	4,559
Prévalence VIH (15-49)	0,034	0,014	233	440	1,204	0,423	0,005	0,062
Prévalence VIH (15-59)	0,041	0,013	252	467	1,043	0,318	0,015	0,067

na = Non-applicable

Tableau B.7 Erreurs de sondage - Echantillon Centre-Sud, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,025	0,005	822	735	0,870	0,190	0,015	0,034
Alphabétisée	0,082	0,025	822	735	2,594	0,303	0,032	0,131
Sans instruction	0,881	0,026	822	735	2,264	0,029	0,830	0,932
Instruction post-primaire ou plus	0,032	0,014	822	735	2,220	0,424	0,005	0,060
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,348	0,069	788	699	3,319	0,197	0,211	0,485
Jamais mariée (en union)	0,172	0,011	822	735	0,810	0,062	0,151	0,193
Actuellement mariée (en union)	0,779	0,013	822	735	0,876	0,016	0,754	0,805
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,798	0,024	625	563	1,497	0,030	0,750	0,846
Actuellement enceinte	0,116	0,011	822	735	0,995	0,096	0,094	0,138
Enfants nés vivants	2,940	0,168	822	735	1,857	0,057	2,603	3,277
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,274	0,244	147	118	1,333	0,039	5,787	6,761
Enfants survivants	2,528	0,164	822	735	2,056	0,065	2,200	2,855
Connaît une méthode contraceptive	0,915	0,015	640	573	1,336	0,016	0,886	0,945
A utilisé une méthode	0,145	0,023	640	573	1,682	0,161	0,098	0,192
Utilise actuellement une méthode	0,064	0,006	640	573	0,599	0,090	0,053	0,076
Utilise actuellement la pilule	0,011	0,003	640	573	0,858	0,327	0,004	0,018
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	640	573	0,898	1,003	0,000	0,004
Utilise actuellement le condom	0,007	0,003	640	573	0,889	0,412	0,001	0,013
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	640	573	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,012	0,004	640	573	0,864	0,305	0,005	0,020
Utilise une source du secteur publique	0,604	0,080	42	36	1,050	0,133	0,443	0,764
Ne veut plus d'enfants	0,211	0,020	640	573	1,244	0,095	0,170	0,251
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,469	0,030	640	573	1,541	0,065	0,408	0,530
Nombre d'enfants idéal	5,662	0,085	781	694	1,311	0,015	5,492	5,832
Mères reçu injection antitétanique	0,774	0,027	488	430	1,431	0,035	0,720	0,829
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,833	0,019	649	562	1,074	0,023	0,794	0,871
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,152	0,020	603	520	1,293	0,129	0,113	0,191
A reçu le traitement SRO	0,198	0,040	88	79	0,939	0,202	0,118	0,279
A consulté du personnel médical	0,123	0,034	88	79	0,943	0,280	0,054	0,192
Ayant un carnet de santé, vue	0,665	0,066	111	92	1,394	0,099	0,533	0,797
A reçu vaccination BCG	0,883	0,031	111	92	0,985	0,035	0,820	0,945
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,585	0,067	111	92	1,367	0,115	0,450	0,719
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,646	0,073	111	92	1,528	0,113	0,500	0,793
A reçu vaccination rougeole	0,656	0,061	111	92	1,282	0,092	0,535	0,777
Vacciné contre toutes les maladies	0,519	0,077	111	92	1,545	0,149	0,365	0,673
Poids pour taille (-2ET)	0,192	0,019	538	478	1,036	0,101	0,153	0,231
Taille pour âge (-2ET)	0,354	0,039	538	478	1,743	0,109	0,277	0,431
Poids pour âge (-2ET)	0,343	0,039	538	478	1,693	0,115	0,264	0,422
Anémie chez les enfants	0,924	0,024	196	163	1,249	0,025	0,877	0,971
Anémie chez les femmes	0,460	0,031	286	247	1,036	0,068	0,398	0,522
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,333	0,030	709	630	1,703	0,091	0,273	0,394
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	5,414	0,376	na	3208	1,337	0,069	4,663	6,165
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	28,422	9,379	1372	1211	1,775	0,330	9,664	47,181
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	38,967	5,507	1374	1212	0,902	0,141	27,954	49,981
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	67,389	13,224	1374	1212	1,486	0,196	40,942	93,837
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	72,533	8,891	1385	1223	0,937	0,123	54,751	90,315
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	135,035	18,948	1387	1225	1,622	0,140	97,139	172,931
Prévalence VIH	0,008	0,004	279	217	0,779	0,535	0,000	0,016
HOMMES								
Milieu urbain	0,054	0,012	238	213	0,787	0,214	0,031	0,077
Sans instruction	0,759	0,049	238	213	1,753	0,064	0,662	0,857
Instruction post-primaire ou plus	0,068	0,017	238	213	1,044	0,251	0,034	0,102
Jamais mariée (en union)	0,332	0,049	238	213	1,595	0,147	0,235	0,430
Actuellement mariée (en union)	0,589	0,038	238	213	1,198	0,065	0,513	0,666
Connaît une méthode contraceptive	0,925	0,020	133	125	0,884	0,022	0,884	0,965
Connaît une méthode moderne	0,916	0,021	133	125	0,887	0,023	0,873	0,959
A utilisé une méthode	0,247	0,050	133	125	1,324	0,201	0,147	0,346
Utilise actuellement une méthode	0,157	0,036	133	125	1,132	0,228	0,085	0,229
Utilise actuellement une méthode moderne	0,141	0,033	133	125	1,102	0,237	0,074	0,207
Utilise actuellement la pilule	0,008	0,008	133	125	1,037	1,005	0,000	0,024
Utilise actuellement les injections	0,023	0,019	133	125	1,473	0,841	0,000	0,061
Utilise actuellement le condom	0,106	0,031	133	125	1,160	0,293	0,044	0,168
Utilise actuellement la continence périodique	0,016	0,012	133	125	1,084	0,729	0,000	0,041
Ne veut plus d'enfants	0,119	0,033	133	125	1,165	0,275	0,054	0,185
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,487	0,052	133	125	1,186	0,106	0,384	0,591
Nombre d'enfants idéal	5,590	0,703	198	176	2,517	0,126	4,184	6,995
Prévalence VIH (15-49)	0,004	0,004	206	175	0,988	1,063	0,000	0,013
Prévalence VIH (15-59)	0,004	0,004	227	196	0,992	1,077	0,000	0,012

na = Non-applicable

Tableau B.8 Erreurs de sondage - Echantillon Plateau Central, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	1084	620	na	na	0,000	0,000
Alphabétisée	0,085	0,023	1084	620	2,738	0,273	0,038	0,131
Sans instruction	0,887	0,027	1084	620	2,818	0,030	0,833	0,942
Instruction post-primaire ou plus	0,039	0,016	1084	620	2,673	0,406	0,007	0,070
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,334	0,036	1144	655	1,987	0,108	0,261	0,406
Jamais mariée (en union)	0,198	0,019	1084	620	1,601	0,098	0,159	0,236
Actuellement mariée (en union)	0,777	0,022	1084	620	1,732	0,028	0,733	0,821
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,808	0,027	852	489	2,028	0,034	0,753	0,862
Actuellement enceinte	0,099	0,012	1084	620	1,368	0,126	0,074	0,124
Enfants nés vivants	3,333	0,113	1084	620	1,336	0,034	3,107	3,560
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,411	0,130	222	120	0,922	0,020	6,151	6,672
Enfants survivants	2,800	0,103	1084	620	1,444	0,037	2,594	3,007
Connaît une méthode contraceptive	0,937	0,018	845	481	2,126	0,019	0,901	0,973
A utilisé une méthode	0,150	0,024	845	481	1,985	0,163	0,101	0,199
Utilise actuellement une méthode	0,060	0,012	845	481	1,491	0,203	0,036	0,084
Utilise actuellement la pilule	0,015	0,006	845	481	1,550	0,439	0,002	0,027
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	845	481	0,997	1,031	0,000	0,003
Utilise actuellement le condom	0,015	0,004	845	481	1,016	0,286	0,006	0,023
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	845	481	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,008	0,003	845	481	0,968	0,383	0,002	0,013
Utilise une source du secteur publique	0,567	0,051	50	29	0,727	0,091	0,464	0,670
Ne veut plus d'enfants	0,205	0,019	845	481	1,350	0,092	0,167	0,242
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,425	0,021	845	481	1,220	0,049	0,384	0,467
Nombre d'enfants idéal	5,553	0,090	1028	592	1,705	0,016	5,374	5,732
Mères reçu injection antitétanique	0,711	0,036	664	382	2,033	0,050	0,640	0,783
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,771	0,057	950	557	3,378	0,074	0,656	0,885
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,184	0,016	859	506	1,210	0,088	0,151	0,216
A reçu le traitement SRO	0,153	0,026	160	93	0,873	0,167	0,102	0,204
A consulté du personnel médical	0,149	0,026	160	93	0,891	0,174	0,097	0,201
Ayant un carnet de santé, vue	0,633	0,099	166	102	2,715	0,156	0,435	0,831
A reçu vaccination BCG	0,761	0,092	166	102	2,864	0,121	0,577	0,945
A reçu vaccination DTCocq (3 doses)	0,571	0,097	166	102	2,600	0,170	0,376	0,766
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,568	0,077	166	102	2,065	0,136	0,413	0,723
A reçu vaccination rougeole	0,501	0,087	166	102	2,295	0,174	0,327	0,675
Vacciné contre toutes les maladies	0,448	0,082	166	102	2,161	0,182	0,285	0,611
Poids pour taille (-2ET)	0,317	0,021	768	460	1,127	0,065	0,276	0,358
Taille pour âge (-2ET)	0,377	0,023	768	460	1,154	0,060	0,332	0,422
Poids pour âge (-2ET)	0,504	0,027	768	460	1,355	0,054	0,450	0,558
Anémie chez les enfants	0,946	0,014	259	171	0,931	0,015	0,917	0,974
Anémie chez les femmes	0,590	0,025	373	221	1,016	0,043	0,539	0,640
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,370	0,025	924	532	1,559	0,067	0,321	0,419
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,372	0,207	na	2735	1,334	0,032	5,959	6,785
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	33,816	4,931	1961	1135	1,216	0,146	23,954	43,679
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	41,044	6,817	1964	1136	1,319	0,166	27,411	54,677
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	74,861	8,586	1964	1136	1,308	0,115	57,689	92,032
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	86,071	9,979	1988	1149	1,338	0,116	66,113	106,029
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	154,488	13,864	1991	1151	1,545	0,090	126,761	182,216
Prévalence VIH	0,014	0,006	374	209	1,038	0,458	0,001	0,026
HOMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	307	178	na	na	0,000	0,000
Sans instruction	0,796	0,046	307	178	1,988	0,057	0,705	0,888
Instruction post-primaire ou plus	0,056	0,020	307	178	1,512	0,355	0,016	0,096
Jamais mariée (en union)	0,427	0,031	307	178	1,114	0,074	0,364	0,490
Actuellement mariée (en union)	0,562	0,031	307	178	1,110	0,056	0,500	0,625
Connaît une méthode contraceptive	0,968	0,013	163	100	0,971	0,014	0,941	0,995
Connaît une méthode moderne	0,968	0,013	163	100	0,971	0,014	0,941	0,995
A utilisé une méthode	0,463	0,043	163	100	1,105	0,094	0,376	0,549
Utilise actuellement une méthode	0,316	0,044	163	100	1,217	0,141	0,227	0,405
Utilise actuellement une méthode moderne	0,237	0,035	163	100	1,061	0,149	0,166	0,308
Utilise actuellement la pilule	0,033	0,014	163	100	1,026	0,436	0,004	0,062
Utilise actuellement les injections	0,023	0,011	163	100	0,961	0,488	0,001	0,046
Utilise actuellement le condom	0,181	0,036	163	100	1,203	0,201	0,108	0,254
Utilise actuellement la continence périodique	0,079	0,035	163	100	1,641	0,441	0,009	0,148
Ne veut plus d'enfants	0,161	0,041	163	100	1,413	0,254	0,079	0,242
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,483	0,052	163	100	1,334	0,108	0,379	0,588
Nombre d'enfants idéal	5,733	0,171	260	150	0,978	0,030	5,391	6,074
Prévalence VIH (15-49)	0,010	0,007	249	142	1,094	0,708	0,000	0,023
Prévalence VIH (15-59)	0,008	0,006	289	168	1,085	0,710	0,000	0,019

na = Non-applicable

Tableau B.9 Erreurs de sondage - Echantillon Centre-Est, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,106	0,020	844	1054	1,920	0,192	0,065	0,146
Alphabétisée	0,129	0,035	844	1054	3,070	0,275	0,058	0,199
Sans instruction	0,854	0,041	844	1054	3,407	0,048	0,771	0,937
Instruction post-primaire ou plus	0,055	0,025	844	1054	3,225	0,461	0,004	0,105
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,310	0,052	727	905	2,566	0,167	0,206	0,413
Jamais mariée (en union)	0,190	0,022	844	1054	1,621	0,115	0,146	0,233
Actuellement mariée (en union)	0,777	0,021	844	1054	1,498	0,028	0,734	0,820
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,724	0,024	661	825	1,376	0,033	0,676	0,772
Actuellement enceinte	0,107	0,010	844	1054	0,944	0,094	0,087	0,127
Enfants nés vivants	3,195	0,135	844	1054	1,379	0,042	2,925	3,465
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,564	0,138	158	184	0,665	0,021	6,288	6,839
Enfants survivants	2,605	0,104	844	1054	1,311	0,040	2,398	2,813
Connaît une méthode contraceptive	0,885	0,026	654	819	2,089	0,029	0,833	0,937
A utilisé une méthode	0,152	0,031	654	819	2,227	0,206	0,089	0,214
Utilise actuellement une méthode	0,062	0,013	654	819	1,404	0,213	0,036	0,089
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,005	654	819	1,210	0,482	0,000	0,019
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,004	654	819	1,574	0,957	0,000	0,012
Utilise actuellement le condom	0,006	0,003	654	819	0,935	0,459	0,001	0,012
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,002	654	819	0,787	0,616	0,000	0,006
Utilise actuellement la continence périodique	0,009	0,003	654	819	0,875	0,366	0,002	0,015
Utilise une source du secteur publique	0,642	0,078	50	59	1,138	0,121	0,486	0,798
Ne veut plus d'enfants	0,249	0,014	654	819	0,798	0,054	0,222	0,276
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,468	0,016	654	819	0,822	0,034	0,436	0,500
Nombre d'enfants idéal	5,521	0,145	819	1021	1,976	0,026	5,231	5,811
Mères reçu injection antitétanique	0,683	0,040	490	615	1,901	0,058	0,604	0,763
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,633	0,048	689	869	2,196	0,076	0,537	0,729
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,242	0,016	631	793	0,963	0,068	0,209	0,274
A reçu le traitement SRO	0,249	0,053	158	192	1,486	0,212	0,143	0,355
A consulté du personnel médical	0,197	0,046	158	192	1,425	0,234	0,104	0,289
Ayant un carnet de santé, vue	0,736	0,046	135	157	1,164	0,062	0,644	0,827
A reçu vaccination BCG	0,776	0,056	135	157	1,498	0,072	0,665	0,887
A reçu vaccination DTCocq (3 doses)	0,594	0,052	135	157	1,193	0,088	0,490	0,699
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,588	0,063	135	157	1,431	0,107	0,462	0,713
A reçu vaccination rougeole	0,628	0,048	135	157	1,112	0,076	0,532	0,724
Vacciné contre toutes les maladies	0,439	0,063	135	157	1,420	0,143	0,313	0,564
Poids pour taille (-2ET)	0,231	0,017	580	714	0,957	0,075	0,196	0,266
Taille pour âge (-2ET)	0,408	0,029	580	714	1,431	0,071	0,350	0,466
Poids pour âge (-2ET)	0,428	0,020	580	714	0,907	0,046	0,389	0,468
Anémie chez les enfants	0,952	0,019	208	243	1,085	0,020	0,914	0,989
Anémie chez les femmes	0,605	0,043	302	377	1,522	0,071	0,520	0,691
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,235	0,023	730	912	1,433	0,096	0,190	0,280
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	5,956	0,319	na	4650	1,388	0,054	5,319	6,594
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	18,009	4,437	1359	1715	1,195	0,246	9,135	26,883
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	46,096	6,257	1362	1720	1,027	0,136	33,583	58,610
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	64,105	9,363	1362	1720	1,271	0,146	45,379	82,831
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	109,650	14,669	1384	1745	1,432	0,134	80,312	138,987
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	166,726	18,839	1387	1751	1,679	0,113	129,048	204,404
Prévalence VIH	0,016	0,006	297	329	0,896	0,413	0,003	0,029
HOMMES								
Milieu urbain	0,112	0,018	207	260	0,820	0,161	0,076	0,148
Sans instruction	0,618	0,063	207	260	1,874	0,103	0,491	0,745
Instruction post-primaire ou plus	0,135	0,042	207	260	1,770	0,312	0,051	0,219
Jamais mariée (en union)	0,393	0,034	207	260	1,011	0,088	0,324	0,462
Actuellement mariée (en union)	0,591	0,034	207	260	0,986	0,057	0,523	0,658
Connaît une méthode contraceptive	0,966	0,018	123	154	1,104	0,019	0,929	1,000
Connaît une méthode moderne	0,931	0,030	123	154	1,313	0,032	0,870	0,991
A utilisé une méthode	0,338	0,063	123	154	1,483	0,188	0,211	0,465
Utilise actuellement une méthode	0,184	0,058	123	154	1,645	0,314	0,068	0,299
Utilise actuellement une méthode moderne	0,122	0,046	123	154	1,570	0,382	0,029	0,215
Utilise actuellement la pilule	0,019	0,013	123	154	1,058	0,683	0,000	0,046
Utilise actuellement les injections	0,005	0,005	123	154	0,822	1,021	0,000	0,016
Utilise actuellement le condom	0,058	0,026	123	154	1,224	0,448	0,006	0,109
Utilise actuellement la continence périodique	0,035	0,014	123	154	0,841	0,402	0,007	0,062
Ne veut plus d'enfants	0,137	0,030	123	154	0,976	0,222	0,076	0,198
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,491	0,051	123	154	1,133	0,104	0,389	0,594
Nombre d'enfants idéal	5,452	0,303	193	242	1,198	0,056	4,846	6,059
Prévalence VIH (15-49)	0,009	0,007	170	210	0,893	0,703	0,000	0,023
Prévalence VIH (15-59)	0,008	0,006	193	235	0,908	0,711	0,000	0,020

na = Non-applicable

Tableau B.10 Erreurs de sondage – Echantillon Centre-Nord, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,051	0,017	966	1053	2,337	0,324	0,018	0,084
Alphabétisée	0,055	0,012	966	1053	1,615	0,216	0,031	0,078
Sans instruction	0,919	0,013	966	1053	1,521	0,014	0,893	0,946
Instruction post-primaire ou plus	0,024	0,007	966	1053	1,419	0,291	0,010	0,038
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,275	0,035	840	948	1,958	0,129	0,204	0,345
Jamais mariée (en union)	0,120	0,014	966	1053	1,362	0,118	0,092	0,149
Actuellement mariée (en union)	0,867	0,015	966	1053	1,374	0,017	0,837	0,897
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,936	0,009	751	824	1,005	0,010	0,917	0,954
Actuellement enceinte	0,108	0,011	966	1053	1,124	0,104	0,086	0,130
Enfants nés vivants	3,452	0,092	966	1053	0,985	0,027	3,269	3,635
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,050	0,254	171	188	1,313	0,036	6,542	7,557
Enfants survivants	2,717	0,072	966	1053	1,000	0,027	2,572	2,861
Connaît une méthode contraceptive	0,935	0,020	814	913	2,364	0,022	0,894	0,976
A utilisé une méthode	0,294	0,027	814	913	1,673	0,091	0,240	0,347
Utilise actuellement une méthode	0,150	0,016	814	913	1,266	0,106	0,119	0,182
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,003	814	913	0,752	0,268	0,004	0,015
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	814	913	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,013	0,005	814	913	1,340	0,403	0,003	0,024
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,002	0,002	814	913	1,155	0,983	0,000	0,005
Utilise actuellement la continence périodique	0,049	0,009	814	913	1,225	0,189	0,031	0,068
Utilise une source du secteur publique	0,762	0,081	88	69	1,783	0,107	0,599	0,925
Ne veut plus d'enfants	0,202	0,020	814	913	1,447	0,101	0,161	0,242
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,522	0,027	814	913	1,540	0,052	0,468	0,576
Nombre d'enfants idéal	5,625	0,123	915	1004	2,128	0,022	5,380	5,871
Mères reçu injection antitétanique	0,656	0,050	623	700	2,672	0,076	0,556	0,756
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,585	0,064	915	1044	3,231	0,110	0,457	0,713
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,175	0,009	780	880	0,608	0,050	0,157	0,192
A reçu le traitement SRO	0,151	0,023	137	154	0,676	0,154	0,105	0,197
A consulté du personnel médical	0,207	0,057	137	154	1,482	0,275	0,093	0,320
Ayant un carnet de santé, vue	0,693	0,064	169	187	1,804	0,092	0,565	0,820
A reçu vaccination BCG	0,884	0,040	169	187	1,632	0,045	0,804	0,964
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,724	0,074	169	187	2,161	0,102	0,576	0,872
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,694	0,081	169	187	2,293	0,117	0,532	0,856
A reçu vaccination rougeole	0,692	0,071	169	187	2,008	0,102	0,550	0,834
Vacciné contre toutes les maladies	0,591	0,079	169	187	2,101	0,134	0,433	0,749
Poids pour taille (-2ET)	0,140	0,017	722	826	1,256	0,119	0,106	0,173
Taille pour âge (-2ET)	0,420	0,028	722	826	1,389	0,067	0,363	0,476
Poids pour âge (-2ET)	0,312	0,026	722	826	1,399	0,082	0,261	0,364
Anémie chez les enfants	0,953	0,010	237	268	0,772	0,011	0,933	0,973
Anémie chez les femmes	0,561	0,031	325	358	1,149	0,056	0,498	0,624
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,205	0,019	807	875	1,304	0,091	0,167	0,242
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,049	0,288	na	4642	1,319	0,041	6,472	7,626
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	34,782	4,804	1762	1989	1,087	0,138	25,175	44,389
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	49,875	8,180	1764	1990	1,572	0,164	33,515	66,236
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	84,657	9,561	1764	1990	1,395	0,113	65,536	103,778
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	124,312	14,327	1794	2026	1,545	0,115	95,659	152,966
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	198,446	17,652	1796	2028	1,683	0,089	163,141	233,751
Prévalence VIH	0,006	0,004	326	331	0,978	0,680	0,000	0,015
HOMMES								
Milieu urbain	0,063	0,018	249	250	1,194	0,292	0,026	0,100
Sans instruction	0,785	0,029	249	250	1,117	0,037	0,726	0,843
Instruction post-primaire ou plus	0,061	0,014	249	250	0,932	0,231	0,033	0,090
Jamais mariée (en union)	0,350	0,025	249	250	0,835	0,072	0,300	0,401
Actuellement mariée (en union)	0,644	0,025	249	250	0,835	0,039	0,593	0,695
Connaît une méthode contraceptive	0,947	0,022	153	161	1,212	0,023	0,902	0,991
Connaît une méthode moderne	0,913	0,026	153	161	1,136	0,028	0,862	0,965
A utilisé une méthode	0,496	0,064	153	161	1,580	0,129	0,368	0,625
Utilise actuellement une méthode	0,369	0,052	153	161	1,331	0,141	0,265	0,473
Utilise actuellement une méthode moderne	0,278	0,037	153	161	1,009	0,132	0,205	0,352
Utilise actuellement la pilule	0,047	0,013	153	161	0,765	0,280	0,021	0,073
Utilise actuellement les injections	0,048	0,018	153	161	1,050	0,378	0,012	0,085
Utilise actuellement le condom	0,176	0,028	153	161	0,912	0,160	0,120	0,232
Utilise actuellement la continence périodique	0,054	0,019	153	161	1,058	0,359	0,015	0,093
Ne veut plus d'enfants	0,068	0,022	153	161	1,073	0,321	0,024	0,112
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,659	0,044	153	161	1,145	0,067	0,571	0,747
Nombre d'enfants idéal	6,754	0,238	237	235	0,980	0,035	6,278	7,231
Prévalence VIH (15-49)	0,011	0,008	208	216	1,066	0,698	0,000	0,027
Prévalence VIH (15-59)	0,010	0,007	231	242	1,058	0,696	0,000	0,024

na = Non-applicable

Tableau B.11 Erreurs de sondage - Echantillon Centre-Ouest, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,131	0,033	1305	905	3,517	0,250	0,066	0,197
Alphabétisée	0,137	0,023	1305	905	2,405	0,167	0,091	0,183
Sans instruction	0,803	0,026	1305	905	2,332	0,032	0,751	0,854
Instruction post-primaire ou plus	0,057	0,012	1305	905	1,796	0,202	0,034	0,080
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,304	0,034	1276	901	2,053	0,111	0,237	0,371
Jamais mariée (en union)	0,206	0,013	1305	905	1,131	0,061	0,181	0,231
Actuellement mariée (en union)	0,752	0,012	1305	905	0,972	0,015	0,729	0,775
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,834	0,015	1011	706	1,243	0,017	0,805	0,863
Actuellement enceinte	0,096	0,009	1305	905	1,151	0,098	0,077	0,115
Enfants nés vivants	3,677	0,100	1305	905	1,118	0,027	3,477	3,877
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,441	0,220	281	204	1,457	0,030	7,001	7,881
Enfants survivants	2,850	0,056	1305	905	0,799	0,020	2,739	2,962
Connaît une méthode contraceptive	0,948	0,012	933	680	1,640	0,013	0,924	0,972
A utilisé une méthode	0,290	0,020	933	680	1,321	0,068	0,251	0,330
Utilise actuellement une méthode	0,099	0,012	933	680	1,250	0,124	0,075	0,123
Utilise actuellement la pilule	0,017	0,003	933	680	0,794	0,199	0,010	0,024
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	933	680	0,706	1,001	0,000	0,002
Utilise actuellement le condom	0,011	0,003	933	680	0,953	0,296	0,005	0,018
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,002	933	680	1,310	0,792	0,000	0,008
Utilise actuellement la continence périodique	0,035	0,007	933	680	1,097	0,188	0,022	0,049
Utilise une source du secteur publique	0,498	0,079	121	68	1,732	0,159	0,340	0,656
Ne veut plus d'enfants	0,290	0,022	933	680	1,466	0,075	0,246	0,333
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,380	0,015	933	680	0,924	0,039	0,350	0,409
Nombre d'enfants idéal	5,544	0,133	1127	782	1,957	0,024	5,279	5,809
Mères reçu injection antitétanique	0,687	0,019	748	531	1,132	0,028	0,649	0,725
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,680	0,040	1072	764	2,359	0,059	0,599	0,760
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,220	0,021	931	655	1,565	0,097	0,177	0,262
A reçu le traitement SRO	0,235	0,031	211	144	1,042	0,134	0,172	0,298
A consulté du personnel médical	0,167	0,027	211	144	0,999	0,161	0,113	0,221
Ayant un carnet de santé, vue	0,720	0,054	162	117	1,550	0,076	0,611	0,829
A reçu vaccination BCG	0,849	0,037	162	117	1,299	0,043	0,776	0,923
A reçu vaccination DTC0q (3 doses)	0,555	0,031	162	117	0,796	0,056	0,493	0,616
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,575	0,036	162	117	0,942	0,063	0,502	0,648
A reçu vaccination rougeole	0,516	0,042	162	117	1,089	0,082	0,431	0,601
Vacciné contre toutes les maladies	0,360	0,037	162	117	0,994	0,103	0,286	0,434
Poids pour taille (-2ET)	0,169	0,016	798	573	1,264	0,096	0,136	0,201
Taille pour âge (-2ET)	0,382	0,021	798	573	1,176	0,056	0,339	0,425
Poids pour âge (-2ET)	0,385	0,014	798	573	0,801	0,036	0,357	0,413
Anémie chez les enfants	0,953	0,011	250	175	0,842	0,011	0,932	0,975
Anémie chez les femmes	0,589	0,034	461	319	1,468	0,057	0,522	0,657
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,188	0,018	1124	778	1,555	0,096	0,152	0,225
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,316	0,183	na	3992	1,171	0,029	5,951	6,682
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	46,902	10,228	2212	1606	2,245	0,218	26,446	67,358
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	63,186	6,732	2218	1610	1,120	0,107	49,723	76,649
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	110,088	11,656	2218	1610	1,628	0,106	86,777	133,399
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	115,647	9,348	2254	1635	1,164	0,081	96,952	134,342
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	213,004	14,706	2260	1639	1,635	0,069	183,591	242,416
Prévalence VIH	0,019	0,006	459	419	0,976	0,329	0,006	0,031
HOMMES								
Milieu urbain	0,150	0,023	346	242	1,189	0,152	0,104	0,196
Sans instruction	0,612	0,055	346	242	2,113	0,091	0,501	0,723
Instruction post-primaire ou plus	0,144	0,033	346	242	1,723	0,226	0,079	0,209
Jamais mariée (en union)	0,538	0,017	346	242	0,627	0,031	0,504	0,572
Actuellement mariée (en union)	0,446	0,018	346	242	0,690	0,041	0,409	0,483
Connaît une méthode contraceptive	0,934	0,029	145	108	1,411	0,031	0,875	0,992
Connaît une méthode moderne	0,892	0,028	145	108	1,089	0,032	0,836	0,948
A utilisé une méthode	0,576	0,058	145	108	1,397	0,100	0,461	0,691
Utilise actuellement une méthode	0,389	0,068	145	108	1,674	0,175	0,253	0,525
Utilise actuellement une méthode moderne	0,122	0,034	145	108	1,238	0,277	0,055	0,190
Utilise actuellement la pilule	0,006	0,006	145	108	0,983	1,039	0,000	0,019
Utilise actuellement les injections	0,011	0,007	145	108	0,852	0,669	0,000	0,026
Utilise actuellement le condom	0,091	0,028	145	108	1,182	0,312	0,034	0,147
Utilise actuellement la continence périodique	0,267	0,054	145	108	1,462	0,202	0,159	0,375
Ne veut plus d'enfants	0,053	0,022	145	108	1,186	0,417	0,009	0,098
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,494	0,039	145	108	0,934	0,079	0,416	0,571
Nombre d'enfants idéal	7,656	0,361	305	210	1,205	0,047	6,935	8,378
Prévalence VIH (15-49)	0,030	0,012	284	273	1,141	0,385	0,007	0,053
Prévalence VIH (15-59)	0,031	0,013	325	312	1,297	0,402	0,006	0,056

na = Non-applicable

Tableau B.12 Erreurs de sondage - Echantillon Est, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,031	0,005	767	905	0,773	0,156	0,021	0,041
Alphabétisée	0,043	0,011	767	905	1,557	0,265	0,020	0,066
Sans instruction	0,949	0,013	767	905	1,671	0,014	0,922	0,975
Instruction post-primaire ou plus	0,019	0,007	767	905	1,459	0,377	0,005	0,034
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,125	0,028	794	940	2,064	0,224	0,069	0,182
Jamais mariée (en union)	0,079	0,012	767	905	1,225	0,151	0,055	0,102
Actuellement mariée (en union)	0,894	0,018	767	905	1,605	0,020	0,858	0,930
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,916	0,014	622	727	1,237	0,015	0,888	0,943
Actuellement enceinte	0,179	0,018	767	905	1,278	0,099	0,143	0,214
Enfants nés vivants	3,507	0,153	767	905	1,499	0,044	3,200	3,813
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,293	0,244	104	129	0,996	0,033	6,805	7,780
Enfants survivants	2,873	0,093	767	905	1,146	0,033	2,686	3,059
Connaît une méthode contraceptive	0,795	0,025	678	809	1,582	0,031	0,746	0,844
A utilisé une méthode	0,273	0,034	678	809	1,979	0,124	0,205	0,341
Utilise actuellement une méthode	0,144	0,031	678	809	2,263	0,212	0,083	0,205
Utilise actuellement la pilule	0,006	0,003	678	809	0,914	0,455	0,001	0,011
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	678	809	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,001	0,001	678	809	0,520	0,524	0,000	0,003
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	678	809	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,065	0,016	678	809	1,651	0,241	0,034	0,096
Utilise une source du secteur publique	0,871	0,098	29	20	1,543	0,112	0,676	1,000
Ne veut plus d'enfants	0,148	0,017	678	809	1,265	0,117	0,114	0,183
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,588	0,023	678	809	1,228	0,040	0,541	0,634
Nombre d'enfants idéal	6,707	0,161	751	889	1,905	0,024	6,386	7,029
Mères reçu injection antitétanique	0,576	0,025	530	629	1,149	0,043	0,526	0,625
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,420	0,048	765	900	2,181	0,114	0,324	0,515
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,138	0,016	678	794	1,159	0,113	0,107	0,169
A reçu le traitement SRO	0,170	0,046	91	109	1,113	0,270	0,078	0,262
A consulté du personnel médical	0,294	0,055	91	109	1,145	0,188	0,183	0,404
Ayant un carnet de santé, vue	0,591	0,050	115	131	1,064	0,084	0,491	0,691
A reçu vaccination BCG	0,786	0,040	115	131	1,030	0,051	0,706	0,867
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,573	0,052	115	131	1,095	0,090	0,470	0,677
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,596	0,057	115	131	1,211	0,095	0,482	0,710
A reçu vaccination rougeole	0,519	0,045	115	131	0,951	0,087	0,428	0,610
Vacciné contre toutes les maladies	0,439	0,050	115	131	1,060	0,114	0,338	0,539
Poids pour taille (-2ET)	0,122	0,019	583	687	1,310	0,157	0,084	0,160
Taille pour âge (-2ET)	0,586	0,042	583	687	1,911	0,072	0,502	0,670
Poids pour âge (-2ET)	0,363	0,029	583	687	1,377	0,080	0,305	0,421
Anémie chez les enfants	0,868	0,031	203	238	1,350	0,036	0,805	0,930
Anémie chez les femmes	0,441	0,041	252	301	1,313	0,093	0,360	0,523
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,134	0,036	613	714	2,602	0,269	0,062	0,206
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,471	0,319	na	4114	1,277	0,049	5,833	7,109
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	41,405	7,331	1506	1815	1,290	0,177	26,743	56,066
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	59,299	12,982	1510	1819	1,878	0,219	33,335	85,263
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	100,704	16,676	1510	1819	1,842	0,166	67,352	134,055
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	84,007	7,372	1518	1831	0,840	0,088	69,262	98,752
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	176,251	14,580	1522	1835	1,389	0,083	147,092	205,410
Prévalence VIH	0,006	0,005	254	279	1,178	0,994	0,000	0,017
HOMMES								
Milieu urbain	0,048	0,010	231	257	0,706	0,207	0,028	0,068
Sans instruction	0,912	0,019	231	257	1,001	0,021	0,874	0,949
Instruction post-primaire ou plus	0,037	0,009	231	257	0,694	0,235	0,019	0,054
Jamais mariée (en union)	0,306	0,035	231	257	1,143	0,113	0,237	0,376
Actuellement mariée (en union)	0,689	0,036	231	257	1,190	0,053	0,616	0,761
Connaît une méthode contraceptive	0,962	0,017	160	177	1,129	0,018	0,928	0,996
Connaît une méthode moderne	0,942	0,023	160	177	1,221	0,024	0,897	0,987
A utilisé une méthode	0,591	0,061	160	177	1,573	0,104	0,468	0,713
Utilise actuellement une méthode	0,343	0,041	160	177	1,101	0,121	0,260	0,426
Utilise actuellement une méthode moderne	0,032	0,012	160	177	0,849	0,372	0,008	0,055
Utilise actuellement la pilule	0,010	0,004	160	177	0,459	0,356	0,003	0,018
Utilise actuellement les injections	0,010	0,009	160	177	1,212	0,963	0,000	0,029
Utilise actuellement le condom	0,012	0,006	160	177	0,689	0,506	0,000	0,023
Utilise actuellement la continence périodique	0,129	0,033	160	177	1,242	0,256	0,063	0,195
Ne veut plus d'enfants	0,057	0,018	160	177	0,967	0,312	0,021	0,092
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,643	0,038	160	177	1,002	0,059	0,567	0,719
Nombre d'enfants idéal	7,811	0,508	221	247	1,393	0,065	6,795	8,827
Prévalence VIH (15-49)	0,031	0,020	196	224	1,637	0,652	0,000	0,072
Prévalence VIH (15-59)	0,035	0,020	216	248	1,571	0,560	0,000	0,075

na = Non-applicable

Tableau B.13 Erreurs de sondage - Echantillon Nord, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,090	0,021	854	1175	2,118	0,230	0,049	0,132
Alphabétisée	0,073	0,011	854	1175	1,206	0,147	0,052	0,095
Sans instruction	0,900	0,012	854	1175	1,138	0,013	0,877	0,923
Instruction post-primaire ou plus	0,038	0,007	854	1175	1,073	0,184	0,024	0,052
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,245	0,023	762	1085	1,284	0,093	0,199	0,291
Jamais mariée (en union)	0,132	0,011	854	1175	0,979	0,086	0,109	0,154
Actuellement mariée (en union)	0,857	0,012	854	1175	0,992	0,014	0,834	0,881
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,884	0,014	666	936	1,168	0,016	0,855	0,913
Actuellement enceinte	0,112	0,014	854	1175	1,263	0,122	0,084	0,139
Enfants nés vivants	3,598	0,096	854	1175	0,922	0,027	3,406	3,789
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,424	0,310	145	210	1,434	0,042	6,804	8,043
Enfants survivants	2,775	0,082	854	1175	1,003	0,030	2,611	2,939
Connaît une méthode contraceptive	0,918	0,014	703	1007	1,318	0,015	0,891	0,945
A utilisé une méthode	0,301	0,024	703	1007	1,361	0,078	0,254	0,348
Utilise actuellement une méthode	0,123	0,015	703	1007	1,248	0,126	0,092	0,154
Utilise actuellement la pilule	0,016	0,003	703	1007	0,565	0,165	0,011	0,022
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,002	703	1007	1,029	0,984	0,000	0,005
Utilise actuellement le condom	0,039	0,005	703	1007	0,648	0,121	0,030	0,048
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	703	1007	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,039	0,008	703	1007	1,091	0,204	0,023	0,055
Utilise une source du secteur publique	0,456	0,092	97	107	1,802	0,201	0,272	0,639
Ne veut plus d'enfants	0,255	0,021	703	1007	1,246	0,080	0,214	0,297
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,482	0,024	703	1007	1,292	0,051	0,433	0,531
Nombre d'enfants idéal	5,375	0,097	836	1148	1,356	0,018	5,181	5,569
Mères reçu injection antitétanique	0,489	0,038	558	807	1,819	0,077	0,414	0,564
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,529	0,052	839	1245	2,523	0,099	0,425	0,633
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,257	0,022	714	1050	1,371	0,087	0,213	0,302
A reçu le traitement SRO	0,181	0,024	178	270	0,816	0,131	0,134	0,229
A consulté du personnel médical	0,106	0,024	178	270	1,017	0,226	0,058	0,154
Ayant un carnet de santé, vue	0,584	0,039	136	204	0,945	0,066	0,507	0,662
A reçu vaccination BCG	0,773	0,041	136	204	1,185	0,053	0,692	0,855
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,367	0,040	136	204	0,995	0,108	0,288	0,446
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,403	0,042	136	204	1,039	0,104	0,319	0,487
A reçu vaccination rougeole	0,473	0,036	136	204	1,443	0,126	0,354	0,593
Vacciné contre toutes les maladies	0,276	0,060	136	204	0,973	0,130	0,205	0,348
Poids pour taille (-2ET)	0,205	0,023	674	986	1,499	0,112	0,159	0,251
Taille pour âge (-2ET)	0,374	0,025	674	986	1,321	0,066	0,324	0,424
Poids pour âge (-2ET)	0,402	0,029	674	986	1,651	0,073	0,344	0,461
Anémie chez les enfants	0,910	0,023	227	321	1,240	0,026	0,864	0,957
Anémie chez les femmes	0,574	0,032	293	406	1,109	0,056	0,510	0,638
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,265	0,025	730	990	1,524	0,095	0,215	0,316
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,727	0,385	na	5245	1,737	0,050	6,958	8,497
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	50,971	5,701	1606	2393	1,009	0,112	39,570	62,372
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	52,673	5,333	1610	2398	0,978	0,101	42,006	63,340
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	103,644	7,866	1610	2398	1,026	0,076	87,913	119,376
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	142,242	12,321	1638	2438	1,188	0,087	117,601	166,883
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	231,143	12,975	1642	2444	1,119	0,056	205,193	257,094
Prévalence VIH	0,010	0,006	290	351	1,091	0,639	0,000	0,023
HOMMES								
Milieu urbain	0,101	0,016	225	290	0,812	0,162	0,068	0,133
Sans instruction	0,735	0,037	225	290	1,261	0,051	0,660	0,809
Instruction post-primaire ou plus	0,089	0,013	225	290	0,690	0,148	0,063	0,115
Jamais mariée (en union)	0,377	0,030	225	290	0,920	0,079	0,317	0,436
Actuellement mariée (en union)	0,617	0,031	225	290	0,951	0,050	0,555	0,678
Connaît une méthode contraceptive	0,898	0,020	133	179	0,769	0,023	0,857	0,939
Connaît une méthode moderne	0,858	0,027	133	179	0,903	0,032	0,803	0,913
A utilisé une méthode	0,687	0,051	133	179	1,276	0,075	0,584	0,790
Utilise actuellement une méthode	0,469	0,051	133	179	1,182	0,109	0,367	0,572
Utilise actuellement une méthode moderne	0,344	0,045	133	179	1,079	0,130	0,255	0,433
Utilise actuellement la pilule	0,055	0,018	133	179	0,919	0,331	0,019	0,092
Utilise actuellement les injections	0,026	0,013	133	179	0,966	0,516	0,000	0,053
Utilise actuellement le condom	0,249	0,048	133	179	1,287	0,194	0,153	0,346
Utilise actuellement la continence périodique	0,125	0,028	133	179	0,965	0,222	0,070	0,181
Ne veut plus d'enfants	0,124	0,029	133	179	1,007	0,233	0,066	0,181
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,588	0,047	133	179	1,099	0,080	0,494	0,683
Nombre d'enfants idéal	6,899	0,706	211	271	1,816	0,102	5,488	8,311
Prévalence VIH (15-49)	0,014	0,010	199	232	1,203	0,727	0,000	0,033
Prévalence VIH (15-59)	0,013	0,009	216	252	1,199	0,725	0,000	0,031

na = Non-applicable

Tableau B.14 Erreurs de sondage - Echantillon Cascades, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base			Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')	Effet de grappe (REPS)		M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,293	0,029	905	410	1,901	0,098	0,235	0,350
Alphabétisée	0,167	0,021	905	410	1,690	0,125	0,125	0,209
Sans instruction	0,780	0,025	905	410	1,784	0,032	0,730	0,829
Instruction post-primaire ou plus	0,082	0,014	905	410	1,551	0,172	0,054	0,111
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,341	0,033	827	398	1,548	0,097	0,274	0,407
Jamais mariée (en union)	0,207	0,015	905	410	1,100	0,072	0,177	0,237
Actuellement mariée (en union)	0,765	0,019	905	410	1,336	0,025	0,727	0,803
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,835	0,013	685	319	0,924	0,016	0,809	0,862
Actuellement enceinte	0,102	0,009	905	410	0,855	0,084	0,085	0,119
Enfants nés vivants	3,606	0,132	905	410	1,237	0,037	3,342	3,870
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,141	0,206	179	86	0,972	0,029	6,728	7,554
Enfants survivants	2,820	0,091	905	410	1,049	0,032	2,637	3,003
Connaît une méthode contraceptive	0,974	0,015	662	314	2,397	0,015	0,945	1,000
A utilisé une méthode	0,265	0,021	662	314	1,198	0,078	0,224	0,306
Utilise actuellement une méthode	0,161	0,015	662	314	1,020	0,090	0,132	0,191
Utilise actuellement la pilule	0,046	0,006	662	314	0,722	0,128	0,034	0,058
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,001	662	314	0,607	0,388	0,001	0,007
Utilise actuellement le condom	0,028	0,007	662	314	1,017	0,232	0,015	0,041
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,003	662	314	0,974	0,550	0,000	0,010
Utilise actuellement la continence périodique	0,021	0,007	662	314	1,298	0,347	0,006	0,035
Utilise une source du secteur publique	0,614	0,056	163	59	1,465	0,091	0,502	0,726
Ne veut plus d'enfants	0,291	0,026	662	314	1,450	0,088	0,240	0,343
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,371	0,024	662	314	1,297	0,066	0,322	0,419
Nombre d'enfants idéal	5,488	0,114	822	368	1,546	0,021	5,260	5,716
Mères reçu injection antitétanique	0,680	0,043	492	237	2,121	0,064	0,593	0,766
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,540	0,064	710	348	2,921	0,118	0,412	0,668
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,161	0,018	622	301	1,203	0,110	0,126	0,197
A reçu le traitement SRO	0,249	0,053	97	48	1,195	0,214	0,142	0,355
A consulté du personnel médical	0,171	0,051	97	48	1,305	0,296	0,070	0,272
Ayant un carnet de santé, vue	0,695	0,064	136	66	1,626	0,092	0,566	0,823
A reçu vaccination BCG	0,809	0,097	136	66	2,884	0,119	0,616	1,000
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,661	0,104	136	66	2,587	0,158	0,453	0,870
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,647	0,103	136	66	2,525	0,160	0,441	0,854
A reçu vaccination rougeole	0,648	0,081	136	66	2,002	0,125	0,487	0,810
Vacciné contre toutes les maladies	0,517	0,099	136	66	2,303	0,191	0,319	0,715
Poids pour taille (-2ET)	0,286	0,026	543	258	1,360	0,093	0,233	0,338
Taille pour âge (-2ET)	0,418	0,025	543	258	1,180	0,059	0,369	0,468
Poids pour âge (-2ET)	0,488	0,028	543	258	1,304	0,057	0,432	0,544
Anémie chez les enfants	0,959	0,012	172	85	0,862	0,012	0,935	0,983
Anémie chez les femmes	0,561	0,032	289	134	1,103	0,057	0,497	0,625
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,240	0,019	794	360	1,277	0,081	0,201	0,279
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,139	0,301	na	1802	1,388	0,049	5,536	6,741
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	50,264	8,502	1423	697	1,331	0,169	33,260	67,267
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	63,135	10,591	1427	700	1,463	0,168	41,952	84,317
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	113,398	17,545	1427	700	1,863	0,155	78,307	148,489
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	110,273	9,891	1454	712	0,882	0,090	90,491	130,055
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	211,166	21,531	1458	714	1,734	0,102	168,104	254,229
Prévalence VIH	0,028	0,008	288	128	0,851	0,295	0,012	0,045
HOMMES								
Milieu urbain	0,359	0,041	273	123	1,394	0,113	0,278	0,440
Sans instruction	0,579	0,049	273	123	1,627	0,084	0,481	0,676
Instruction post-primaire ou plus	0,255	0,031	273	123	1,164	0,121	0,194	0,317
Jamais mariée (en union)	0,442	0,031	273	123	1,021	0,070	0,380	0,503
Actuellement mariée (en union)	0,545	0,035	273	123	1,145	0,064	0,475	0,614
Connaît une méthode contraceptive	0,946	0,026	143	67	1,350	0,027	0,895	0,997
Connaît une méthode moderne	0,946	0,026	143	67	1,350	0,027	0,895	0,997
A utilisé une méthode	0,388	0,036	143	67	0,872	0,092	0,317	0,459
Utilise actuellement une méthode	0,338	0,036	143	67	0,912	0,107	0,265	0,410
Utilise actuellement une méthode moderne	0,309	0,040	143	67	1,023	0,128	0,230	0,389
Utilise actuellement la pilule	0,134	0,036	143	67	1,244	0,266	0,063	0,205
Utilise actuellement les injections	0,016	0,011	143	67	1,070	0,704	0,000	0,038
Utilise actuellement le condom	0,157	0,027	143	67	0,872	0,170	0,104	0,210
Utilise actuellement la continence périodique	0,026	0,018	143	67	1,344	0,692	0,000	0,062
Ne veut plus d'enfants	0,263	0,058	143	67	1,582	0,222	0,146	0,380
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,405	0,043	143	67	1,054	0,107	0,318	0,491
Nombre d'enfants idéal	5,670	0,320	240	107	1,283	0,056	5,030	6,309
Prévalence VIH (15-49)	0,020	0,011	204	98	1,085	0,538	0,000	0,041
Prévalence VIH (15-59)	0,021	0,010	247	119	1,070	0,470	0,001	0,040

na = Non-applicable

Tableau B.15 Erreurs de sondage - Echantillon Hauts-Bassins, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,358	0,041	1146	1606	2,881	0,114	0,277	0,440
Alphabétisée	0,189	0,029	1146	1606	2,505	0,153	0,131	0,247
Sans instruction	0,768	0,032	1146	1606	2,585	0,042	0,703	0,832
Instruction post-primaire ou plus	0,101	0,019	1146	1606	2,158	0,190	0,063	0,140
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,368	0,041	844	1236	1,928	0,111	0,286	0,449
Jamais mariée (en union)	0,204	0,023	1146	1606	1,928	0,113	0,158	0,250
Actuellement mariée (en union)	0,762	0,025	1146	1606	1,971	0,033	0,713	0,812
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,832	0,021	839	1201	1,612	0,025	0,790	0,874
Actuellement enceinte	0,108	0,009	1146	1606	0,945	0,080	0,091	0,126
Enfants nés vivants	3,177	0,092	1146	1606	1,037	0,029	2,992	3,361
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,716	0,341	177	261	1,593	0,051	6,034	7,398
Enfants survivants	2,551	0,074	1146	1606	1,034	0,029	2,403	2,698
Connaît une méthode contraceptive	0,942	0,016	787	1224	1,940	0,017	0,909	0,974
A utilisé une méthode	0,334	0,034	787	1224	2,032	0,102	0,266	0,403
Utilise actuellement une méthode	0,141	0,018	787	1224	1,440	0,127	0,105	0,176
Utilise actuellement la pilule	0,039	0,010	787	1224	1,504	0,266	0,018	0,060
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,001	787	1224	0,598	0,375	0,001	0,006
Utilise actuellement le condom	0,031	0,005	787	1224	0,854	0,171	0,020	0,041
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	787	1224	0,567	1,006	0,000	0,001
Utilise actuellement la continence périodique	0,014	0,003	787	1224	0,814	0,248	0,007	0,020
Utilise une source du secteur publique	0,531	0,042	214	208	1,224	0,079	0,447	0,614
Ne veut plus d'enfants	0,228	0,019	787	1224	1,271	0,083	0,190	0,266
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,492	0,034	787	1224	1,898	0,069	0,425	0,560
Nombre d'enfants idéal	5,076	0,089	1101	1540	1,504	0,018	4,897	5,255
Mères reçu injection antitétanique	0,701	0,019	618	975	1,088	0,027	0,664	0,739
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,527	0,065	873	1443	3,515	0,124	0,396	0,657
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,171	0,034	777	1260	2,542	0,201	0,102	0,239
A reçu le traitement SRO	0,259	0,043	121	215	1,098	0,166	0,173	0,345
A consulté du personnel médical	0,162	0,024	121	215	0,800	0,149	0,114	0,211
Ayant un carnet de santé, vue	0,614	0,099	153	258	2,761	0,161	0,416	0,812
A reçu vaccination BCG	0,699	0,106	153	258	3,120	0,151	0,488	0,910
A reçu vaccination DTCocq (3 doses)	0,526	0,098	153	258	2,672	0,187	0,329	0,723
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,552	0,101	153	258	2,762	0,183	0,350	0,755
A reçu vaccination rougeole	0,477	0,084	153	258	2,269	0,175	0,309	0,644
Vacciné contre toutes les maladies	0,382	0,073	153	258	2,049	0,192	0,236	0,529
Poids pour taille (-2ET)	0,135	0,024	752	1166	1,979	0,180	0,086	0,184
Taille pour âge (-2ET)	0,329	0,039	752	1166	2,259	0,119	0,251	0,407
Poids pour âge (-2ET)	0,291	0,034	752	1166	1,937	0,116	0,223	0,358
Anémie chez les enfants	0,885	0,020	219	352	1,064	0,022	0,845	0,924
Anémie chez les femmes	0,558	0,022	384	572	0,880	0,039	0,515	0,602
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,151	0,018	1005	1380	1,580	0,119	0,115	0,188
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,445	0,443	na	7075	2,028	0,069	5,558	7,331
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	36,984	7,042	1643	2674	1,411	0,190	22,899	51,068
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	51,049	7,263	1646	2679	1,415	0,142	36,522	65,576
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	88,033	10,016	1648	2683	1,329	0,114	68,001	108,064
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	116,413	14,362	1665	2715	1,433	0,123	87,688	145,138
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	194,198	20,166	1672	2729	1,730	0,104	153,865	234,530
Prévalence VIH	0,022	0,006	382	551	0,785	0,268	0,010	0,034
HOMMES								
Milieu urbain	0,352	0,045	377	537	1,829	0,128	0,262	0,442
Sans instruction	0,563	0,051	377	537	1,982	0,090	0,461	0,664
Instruction post-primaire ou plus	0,237	0,041	377	537	1,878	0,174	0,155	0,320
Jamais mariée (en union)	0,498	0,040	377	537	1,556	0,080	0,418	0,579
Actuellement mariée (en union)	0,490	0,040	377	537	1,556	0,082	0,410	0,570
Connaît une méthode contraceptive	1,000	0,000	170	263	na	0,000	1,000	1,000
Connaît une méthode moderne	1,000	0,000	170	263	na	0,000	1,000	1,000
A utilisé une méthode	0,696	0,060	170	263	1,686	0,086	0,577	0,815
Utilise actuellement une méthode	0,536	0,072	170	263	1,872	0,134	0,393	0,680
Utilise actuellement une méthode moderne	0,273	0,051	170	263	1,495	0,188	0,170	0,375
Utilise actuellement la pilule	0,089	0,028	170	263	1,269	0,312	0,034	0,145
Utilise actuellement les injections	0,042	0,016	170	263	1,049	0,383	0,010	0,075
Utilise actuellement le condom	0,124	0,025	170	263	0,985	0,202	0,074	0,174
Utilise actuellement la continence périodique	0,140	0,028	170	263	1,052	0,200	0,084	0,196
Ne veut plus d'enfants	0,162	0,034	170	263	1,202	0,211	0,094	0,230
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,445	0,023	170	263	0,605	0,052	0,399	0,491
Nombre d'enfants idéal	6,867	0,377	315	431	1,227	0,055	6,113	7,622
Prévalence VIH (15-49)	0,011	0,004	315	478	0,729	0,393	0,002	0,019
Prévalence VIH (15-59)	0,010	0,004	336	516	0,728	0,395	0,002	0,018

na = Non-applicable

Tableau B.16 Erreurs de sondage - Echantillon Sahel, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,022	0,009	767	848	1,642	0,398	0,004	0,039
Alphabétisée	0,036	0,012	767	848	1,703	0,317	0,013	0,059
Sans instruction	0,927	0,017	767	848	1,845	0,019	0,892	0,962
Instruction post-primaire ou plus	0,014	0,007	767	848	1,527	0,455	0,001	0,028
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,176	0,042	617	682	2,272	0,239	0,092	0,260
Jamais mariée (en union)	0,077	0,012	767	848	1,243	0,155	0,053	0,101
Actuellement mariée (en union)	0,881	0,017	767	848	1,464	0,019	0,846	0,915
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,953	0,013	615	675	1,476	0,013	0,928	0,979
Actuellement enceinte	0,104	0,016	767	848	1,459	0,155	0,072	0,136
Enfants nés vivants	3,758	0,128	767	848	1,124	0,034	3,501	4,014
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,495	0,247	141	162	1,028	0,033	7,001	7,988
Enfants survivants	2,703	0,088	767	848	1,008	0,033	2,527	2,879
Connaît une méthode contraceptive	0,811	0,024	657	747	1,562	0,029	0,763	0,858
A utilisé une méthode	0,097	0,029	657	747	2,488	0,296	0,040	0,155
Utilise actuellement une méthode	0,035	0,013	657	747	1,823	0,374	0,009	0,061
Utilise actuellement la pilule	0,014	0,006	657	747	1,276	0,417	0,002	0,026
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	657	747	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,004	0,002	657	747	0,988	0,628	0,000	0,008
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	657	747	0,626	1,006	0,000	0,002
Utilise actuellement la continence périodique	0,003	0,002	657	747	0,880	0,663	0,000	0,006
Utilise une source du secteur publique	0,667	0,077	42	29	1,044	0,115	0,513	0,820
Ne veut plus d'enfants	0,155	0,021	657	747	1,479	0,135	0,113	0,197
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,503	0,020	657	747	1,026	0,040	0,463	0,543
Nombre d'enfants idéal	7,175	0,198	760	842	2,129	0,028	6,779	7,572
Mères reçu injection antitétanique	0,493	0,044	502	572	2,022	0,090	0,404	0,582
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,203	0,061	779	893	3,441	0,301	0,081	0,326
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,340	0,029	625	730	1,490	0,085	0,283	0,398
A reçu le traitement SRO	0,083	0,037	194	248	1,885	0,446	0,009	0,157
A consulté du personnel médical	0,091	0,032	194	248	1,683	0,355	0,026	0,155
Ayant un carnet de santé, vue	0,517	0,098	127	141	2,198	0,190	0,321	0,713
A reçu vaccination BCG	0,657	0,098	127	141	2,318	0,149	0,461	0,853
A reçu vaccination DTCoq (3 doses)	0,393	0,092	127	141	2,110	0,235	0,208	0,577
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,409	0,079	127	141	1,811	0,194	0,250	0,567
A reçu vaccination rougeole	0,337	0,085	127	141	1,998	0,252	0,168	0,507
Vacciné contre toutes les maladies	0,232	0,065	127	141	1,722	0,278	0,103	0,361
Poids pour taille (-2ET)	0,187	0,029	562	661	1,808	0,153	0,130	0,244
Taille pour âge (-2ET)	0,494	0,022	562	661	1,109	0,045	0,450	0,539
Poids pour âge (-2ET)	0,488	0,031	562	661	1,558	0,063	0,426	0,549
Anémie chez les enfants	0,956	0,014	170	213	0,936	0,014	0,928	0,983
Anémie chez les femmes	0,624	0,037	257	290	1,248	0,060	0,549	0,698
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,275	0,028	644	715	1,582	0,101	0,220	0,331
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,404	0,342	na	3762	1,467	0,046	6,720	8,089
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	53,688	8,542	1535	1720	1,278	0,159	36,604	70,772
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	67,980	8,110	1540	1724	1,366	0,119	51,760	84,200
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	121,668	11,204	1540	1724	1,344	0,092	99,260	144,076
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	185,430	23,313	1582	1768	1,701	0,126	138,804	232,056
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	284,537	26,755	1587	1773	1,968	0,094	231,027	338,048
Prévalence VIH	0,002	0,002	257	272	0,804	1,011	0,000	0,007
HOMMES								
Milieu urbain	0,017	0,003	238	275	0,413	0,206	0,010	0,024
Sans instruction	0,868	0,044	238	275	2,001	0,051	0,780	0,956
Instruction post-primaire ou plus	0,032	0,013	238	275	1,098	0,391	0,007	0,057
Jamais mariée (en union)	0,344	0,038	238	275	1,216	0,109	0,269	0,419
Actuellement mariée (en union)	0,640	0,038	238	275	1,232	0,060	0,563	0,717
Connaît une méthode contraceptive	0,881	0,029	150	176	1,101	0,033	0,823	0,939
Connaît une méthode moderne	0,819	0,037	150	176	1,169	0,045	0,745	0,893
A utilisé une méthode	0,346	0,035	150	176	0,890	0,100	0,276	0,415
Utilise actuellement une méthode	0,117	0,027	150	176	1,039	0,234	0,062	0,172
Utilise actuellement une méthode moderne	0,069	0,020	150	176	0,943	0,283	0,030	0,109
Utilise actuellement la pilule	0,019	0,011	150	176	0,964	0,569	0,000	0,040
Utilise actuellement les injections	0,011	0,009	150	176	1,025	0,800	0,000	0,028
Utilise actuellement le condom	0,040	0,021	150	176	1,324	0,534	0,000	0,082
Utilise actuellement la continence périodique	0,039	0,019	150	176	1,178	0,481	0,001	0,076
Ne veut plus d'enfants	0,060	0,016	150	176	0,813	0,264	0,028	0,091
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,510	0,031	150	176	0,760	0,061	0,448	0,572
Nombre d'enfants idéal	7,633	0,338	236	272	1,445	0,044	6,957	8,309
Prévalence VIH (15-49)	0,000	0,000	205	230	na	na	0,000	0,000
Prévalence VIH (15-59)	0,000	0,000	231	260	na	na	0,000	0,000

na = Non-applicable

Tableau B.17 Erreurs de sondage - Echantillon Sud-Ouest, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N')			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,052	0,017	1056	599	2,432	0,319	0,019	0,086
Alphabétisée	0,080	0,018	1056	599	2,192	0,229	0,043	0,117
Sans instruction	0,883	0,023	1056	599	2,334	0,026	0,836	0,929
Instruction post-primaire ou plus	0,038	0,012	1056	599	2,125	0,331	0,013	0,062
Taux net de fréquentation scolaire (primaire)	0,235	0,036	1081	635	2,175	0,153	0,163	0,307
Jamais mariée (en union)	0,139	0,018	1056	599	1,735	0,133	0,102	0,176
Actuellement mariée (en union)	0,788	0,022	1056	599	1,713	0,027	0,745	0,831
Mariée avant l'âge de 20 ans	0,819	0,019	868	491	1,435	0,023	0,781	0,856
Actuellement enceinte	0,097	0,009	1056	599	1,019	0,095	0,079	0,116
Enfants nés vivants	3,772	0,135	1056	599	1,424	0,036	3,502	4,042
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,194	0,188	220	125	1,129	0,026	6,818	7,570
Enfants survivants	2,928	0,093	1056	599	1,264	0,032	2,742	3,114
Connaît une méthode contraceptive	0,937	0,012	834	472	1,434	0,013	0,913	0,961
A utilisé une méthode	0,572	0,036	834	472	2,102	0,063	0,499	0,644
Utilise actuellement une méthode	0,297	0,020	834	472	1,289	0,069	0,256	0,337
Utilise actuellement la pilule	0,019	0,005	834	472	1,052	0,265	0,009	0,028
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	834	472	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,005	0,001	834	472	0,413	0,211	0,003	0,007
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	834	472	na	na	0,000	0,000
Utilise actuellement la continence périodique	0,057	0,010	834	472	1,290	0,183	0,036	0,077
Utilise une source du secteur publique	0,823	0,047	59	38	0,933	0,057	0,730	0,917
Ne veut plus d'enfants	0,171	0,020	834	472	1,512	0,115	0,132	0,211
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,488	0,025	834	472	1,416	0,050	0,439	0,537
Nombre d'enfants idéal	6,887	0,165	977	555	1,544	0,024	6,557	7,217
Mères reçu injection antitétanique	0,595	0,038	678	389	2,044	0,064	0,518	0,671
Mères reçu assistance médicale à l'accouchement	0,283	0,042	985	564	2,475	0,150	0,198	0,367
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,169	0,017	869	496	1,268	0,100	0,136	0,203
A reçu le traitement SRO	0,203	0,041	164	84	1,217	0,202	0,121	0,285
A consulté du personnel médical	0,118	0,033	164	84	1,229	0,281	0,052	0,185
Ayant un carnet de santé, vue	0,622	0,074	152	89	1,907	0,119	0,474	0,771
A reçu vaccination BCG	0,904	0,036	152	89	1,533	0,040	0,832	0,976
A reçu vaccination DTCocq (3 doses)	0,660	0,061	152	89	1,617	0,092	0,538	0,782
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,700	0,064	152	89	1,733	0,091	0,573	0,828
A reçu vaccination rougeole	0,650	0,068	152	89	1,774	0,105	0,514	0,786
Vacciné contre toutes les maladies	0,533	0,058	152	89	1,474	0,110	0,416	0,650
Poids pour taille (-2ET)	0,204	0,018	789	450	1,255	0,086	0,169	0,239
Taille pour âge (-2ET)	0,404	0,016	789	450	0,893	0,040	0,372	0,436
Poids pour âge (-2ET)	0,438	0,014	789	450	0,743	0,032	0,410	0,467
Anémie chez les enfants	0,885	0,030	260	146	1,579	0,033	0,825	0,944
Anémie chez les femmes	0,396	0,018	356	202	0,710	0,047	0,359	0,433
Indice de masse corporelle sous 18,5	0,205	0,022	911	515	1,622	0,106	0,161	0,248
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,737	0,214	na	2695	1,070	0,032	6,310	7,165
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	35,425	3,957	2022	1161	0,875	0,112	27,510	43,339
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans)	77,903	7,442	2027	1163	1,103	0,096	63,019	92,787
Quotient de mortalité infantile (10 ans)	113,328	8,412	2027	1163	1,041	0,074	96,504	130,152
Quotient de mortalité juvénile (10 ans)	100,772	9,918	2056	1181	1,166	0,098	80,936	120,608
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans)	202,680	13,160	2061	1184	1,258	0,065	176,360	229,000
Prévalence VIH	0,037	0,007	354	182	0,701	0,189	0,023	0,052
HOMMES								
Milieu urbain	0,052	0,013	317	167	1,023	0,245	0,027	0,078
Sans instruction	0,743	0,034	317	167	1,370	0,045	0,675	0,810
Instruction post-primaire ou plus	0,105	0,030	317	167	1,732	0,284	0,046	0,165
Jamais mariée (en union)	0,337	0,026	317	167	0,972	0,077	0,285	0,389
Actuellement mariée (en union)	0,640	0,027	317	167	1,013	0,043	0,585	0,695
Connaît une méthode contraceptive	0,973	0,010	202	107	0,882	0,010	0,953	0,993
Connaît une méthode moderne	0,942	0,018	202	107	1,080	0,019	0,907	0,978
A utilisé une méthode	0,650	0,054	202	107	1,611	0,083	0,541	0,758
Utilise actuellement une méthode	0,527	0,052	202	107	1,479	0,099	0,423	0,631
Utilise actuellement une méthode moderne	0,184	0,029	202	107	1,048	0,156	0,127	0,241
Utilise actuellement la pilule	0,039	0,016	202	107	1,210	0,425	0,006	0,072
Utilise actuellement les injections	0,034	0,018	202	107	1,424	0,534	0,000	0,071
Utilise actuellement le condom	0,080	0,017	202	107	0,910	0,218	0,045	0,115
Utilise actuellement la continence périodique	0,145	0,022	202	107	0,890	0,152	0,101	0,189
Ne veut plus d'enfants	0,123	0,022	202	107	0,939	0,177	0,080	0,167
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,409	0,027	202	107	0,777	0,066	0,355	0,463
Nombre d'enfants idéal	8,878	0,427	244	127	0,942	0,048	8,025	9,732
Prévalence VIH (15-49)	0,037	0,011	267	132	0,967	0,301	0,015	0,060
Prévalence VIH (15-59)	0,032	0,010	312	155	0,962	0,300	0,013	0,051

na = Non-applicable

REGROUPEMENT DES PROVINCES PAR RÉGION DE RÉSIDENCE

Région	Province
OUAGADOUGOU	Ville de Ouagadougou
BOUCLE DU MOUHOUN	Balé Kossi Mouhoun Sourou Banwa Nayala
CENTRE (sans Ouagadougou)	Kadiogo (sans Ouagadougou)
CENTRE/SUD	Bazèga Nahouri Zoundwéogo
PLATEAU CENTRAL	Ganzourgou Kourwéogo Oubritenga
CENTRE/EST	Boulgou Kouritenga Koulpelogo
CENTRE/NORD	Bam Sanmatenga Namentenga
CENTRE/OUEST	Boulkiemdé Sanguié Sissili Ziro

EST

Gourma
Gnagna
Komandjoari
Kompienga
Tapoa

NORD

Passoré
Yatenga
Zondoma
Loroum

CASCADES

Comoé
Léraba

HAUTS-BASSINS

Houet
Kéné Dougou
Tuy

SAHEL

Séno
Oudalan
Soum
Yagha

SUD/OUEST

PONI
BOUGOURIBA
IOBA
NOUMBIEL
