

Tableau D.3.4.1 Exposition aux médias : femmes

Pourcentage de femmes qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio au moins une fois par semaine, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Lit un journal au moins une fois par semaine	Regarde la télévision au moins une fois par semaine	Écoute la radio au moins une fois par semaine	Tous les trois médias	Aucun média	Effectif
Ouagadougou	26,7	73,9	77,7	22,7	8,7	1 418
Boucle du Mouhoun	2,0	25,4	51,0	1,5	41,2	910
Centre (Sans Ouaga.)	1,8	9,8	67,1	0,2	31,5	239
Centre-Sud	2,6	6,4	45,9	1,2	53,8	735
Plateau Central	2,2	4,7	50,6	0,4	48,5	620
Centre-Est	4,5	6,9	41,7	2,1	56,3	1 054
Centre-Nord	0,4	5,9	44,9	0,2	54,5	1 053
Centre-Ouest	3,8	13,5	56,1	1,8	40,8	905
Est	1,8	2,5	22,7	1,0	76,7	905
Nord	1,5	14,8	66,2	1,1	30,6	1 175
Cascades	6,4	18,6	57,1	5,3	40,4	410
Hauts-Bassins	6,4	39,0	59,2	4,6	30,3	1 606
Sahel	0,8	3,4	24,6	0,5	73,9	848
Sud-Ouest	2,8	6,5	32,8	1,3	65,2	599
Ensemble	5,7	20,9	51,0	4,1	44,3	12 477

Tableau D.3.4.2 Exposition aux médias : hommes

Pourcentage d'hommes qui, habituellement, lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio au moins une fois par semaine, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Lit un journal au moins une fois par semaine	Regarde la télévision au moins une fois par semaine	Écoute la radio au moins une fois par semaine	Tous les trois médias	Aucun média	Effectif
Ouagadougou	38,5	81,2	90,1	34,7	4,3	464
Boucle du Mouhoun	5,9	28,8	69,1	4,6	22,7	277
Centre (Sans Ouaga.)	0,6	21,2	81,4	0,6	16,8	72
Centre-Sud	2,2	16,4	80,1	2,0	17,0	213
Plateau Central	2,6	18,5	71,2	2,4	25,5	178
Centre-Est	9,3	15,4	63,0	5,2	34,6	260
Centre-Nord	3,7	11,0	70,5	1,5	29,2	250
Centre-Ouest	9,0	26,6	78,1	5,5	16,2	242
Est	2,5	3,9	16,9	0,9	80,7	257
Nord	7,6	16,1	85,2	4,5	13,6	290
Cascades	12,9	31,4	79,0	10,5	20,1	123
Hauts-Bassins	11,9	51,2	80,6	8,6	13,3	537
Sahel	3,8	11,4	61,3	1,3	33,8	275
Sud-Ouest	5,6	7,1	53,6	2,2	45,4	167
Ensemble	10,8	30,1	71,4	8,2	24,7	3 605

Tableau D.4.6 Intervalle intergénérisique

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang 1, des cinq années précédant l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente					Total	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente	Effectif de naissances
	7-17	18-23	24-35	36-47	48+			
Ouagadougou	3,9	6,1	32,9	19,9	37,1	100,0	38,5	422
Boucle du Mouhoun	3,6	9,9	41,0	26,6	19,0	100,0	34,5	728
Centre (Sans Ouaga.)	5,9	4,6	37,5	32,2	19,7	100,0	36,4	165
Centre-Sud	0,5	6,5	29,4	34,6	29,0	100,0	39,9	442
Plateau Central	0,9	8,6	37,0	31,3	22,2	100,0	37,3	465
Centre-Est	1,5	7,7	31,4	36,3	23,1	100,0	38,0	708
Centre-Nord	1,9	5,8	38,2	31,7	22,5	100,0	37,0	857
Centre-Ouest	4,5	6,0	38,3	26,6	24,6	100,0	36,5	632
Est	2,5	9,7	42,8	31,2	13,9	100,0	34,9	724
Nord	6,4	12,9	37,7	27,9	15,0	100,0	34,1	1 013
Cascades	3,0	9,8	40,9	26,7	19,6	100,0	35,1	280
Hauts-Bassins	3,5	12,3	39,4	24,9	20,0	100,0	34,7	1 144
Sahel	7,8	14,9	37,6	23,5	16,2	100,0	33,0	734
Sud-Ouest	3,2	11,1	34,9	26,1	24,7	100,0	36,2	471
Ensemble	3,6	9,6	37,4	28,3	21,0	100,0	35,8	8 785

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Tableau D.5.5 Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques socio-démographiques

Répartition (en %) des femmes actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Méthodes modernes									Méthodes traditionnelles						Total	Effectif	
	N'im- porte quelle méth- ode mod- erne	N'im- porte quelle méth- ode mod- erne	Sterili- sation fémi- nin	Pilule	DIU	Injecta- bles	Im- plants	Con- dom- mas- culin	Mousse/ gelée	N'im- porte méthode tradi- tionnelle	MAMA	Conti- nence péri- odique	Retrait	Absti- nence	Autres			N'utilise pas actuel- lement
Ouagadougou	36,7	29,5	0,0	8,0	4,1	4,8	3,4	8,8	0,5	7,2	0,5	5,9	0,3	0,0	0,5	63,3	100,0	694
Boucle du Mouhoun	13,0	10,7	0,1	1,5	0,3	4,1	2,9	1,6	0,0	2,4	0,0	1,7	0,0	0,4	0,2	87,0	100,0	729
Centre (Sans Ouaga.)	15,6	7,8	0,0	1,0	0,4	3,6	0,8	2,0	0,0	7,8	0,4	7,0	0,4	0,0	0,0	84,4	100,0	192
Centre-Sud	6,4	4,9	0,0	1,1	0,1	2,4	0,5	0,7	0,1	1,5	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	93,6	100,0	573
Plateau Central	6,0	5,1	0,0	1,5	0,1	2,0	0,0	1,5	0,0	0,9	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	94,0	100,0	481
Centre-Est	6,2	5,1	0,2	1,0	0,4	1,8	1,1	0,6	0,0	1,1	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	93,8	100,0	819
Centre-Nord	15,0	6,6	0,2	1,0	0,0	3,6	0,5	1,3	0,0	8,5	0,0	4,9	0,1	3,5	0,0	85,0	100,0	913
Centre-Ouest	9,9	6,0	0,3	1,7	0,1	2,2	0,6	1,1	0,0	3,9	0,1	3,5	0,2	0,0	0,0	90,1	100,0	680
Est	14,4	2,2	0,0	0,6	0,0	1,3	0,2	0,1	0,0	12,2	0,1	6,5	0,0	5,2	0,5	85,6	100,0	809
Nord	12,3	8,2	0,0	1,6	0,2	1,4	1,1	3,9	0,0	4,1	0,2	3,9	0,0	0,0	0,0	87,7	100,0	1 007
Cascades	16,1	13,8	0,5	4,6	0,4	4,2	1,3	2,8	0,0	2,3	0,1	2,1	0,0	0,0	0,2	83,9	100,0	314
Hauts-Bassins	14,1	11,6	0,0	3,9	0,3	2,3	2,0	3,1	0,0	2,4	0,1	1,4	0,5	0,0	0,5	85,9	100,0	1 224
Sahel	3,5	3,0	0,1	1,4	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	96,5	100,0	747
Sud-Ouest	29,7	6,9	0,0	1,9	0,0	2,4	2,2	0,5	0,0	22,8	0,2	5,7	0,0	16,6	0,4	70,3	100,0	472
Ensemble	13,8	8,6	0,1	2,2	0,4	2,5	1,2	2,1	0,0	5,1	0,1	3,1	0,1	1,6	0,2	86,2	100,0	9 655

MAMA = Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Dans certains pays, cette méthode est classée parmi les méthodes modernes.

Tableau D.5.15 Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des agents de planification familiale

Pourcentage des non-utilisatrices de la contraception qui ont été contactées par un agent de terrain qui lui a parlé de planification familiale, qui ont visité un service de santé mais qui n'ont pas parlé des méthodes de planification familiale, au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Femme visitée par agent de terrain et discuté de PF	Femme ayant été au Centre de santé et discuté PF	Femme ayant été au Centre de santé et pas discuté PF	N'a pas discuté du PF avec un agent de terrain	Effectif
Ouagadougou	6,4	8,3	39,0	87,7	984
Boucle du Mouhoun	9,1	5,0	21,1	86,9	794
Centre (Sans Ouaga.)	7,3	7,9	39,0	86,7	204
Centre-Sud	5,6	3,4	17,3	92,7	690
Plateau Central	3,2	2,2	23,6	94,7	586
Centre-Est	14,2	9,5	34,1	80,1	984
Centre-Nord	15,7	5,7	22,1	80,4	906
Centre-Ouest	8,6	4,5	28,7	88,6	809
Est	4,4	6,1	19,1	90,3	786
Nord	19,3	5,5	17,3	77,7	1 025
Cascades	10,3	11,2	19,2	80,2	344
Hauts-Bassins	3,6	5,9	32,0	90,9	1 363
Sahel	7,9	1,8	19,2	91,2	814
Sud-Ouest	6,3	2,4	22,5	91,7	448
Ensemble	9,0	5,6	25,6	86,9	10 736

Tableau D.7.4 Besoins en matière de planification familiale

Pourcentage de femmes actuellement en union ayant des besoins non-satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins sont satisfaits et pourcentage de demande potentielle totale de services de planification familiale, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale ¹ pour :			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisatrices actuelles) ² pour :			Demande potentielle totale en matière de planification familiale ³ pour :			Pourcentage de demande satisfaite	
	Espacer	Limiter	Ensemble	Espacer	Limiter	Ensemble	Espacer	Limiter	Ensemble	satisfaite	Effectif
Ouagadougou	13,0	6,6	19,5	25,7	11,0	36,7	38,6	17,6	56,2	65,3	694
Boucle du Mouhoun	18,2	9,1	27,2	6,4	6,6	13,0	24,6	15,7	40,3	32,4	729
Centre (Sans Ouaga.)	23,5	11,7	35,2	10,6	5,0	15,6	34,1	16,8	50,9	30,7	192
Centre-Sud	19,7	6,2	25,9	4,5	1,9	6,4	24,2	8,1	32,3	19,9	573
Plateau Central	26,3	7,4	33,7	4,6	1,4	6,0	30,8	8,9	39,7	15,1	481
Centre-Est	23,0	6,8	29,8	4,3	1,9	6,2	27,3	8,7	36,0	17,3	819
Centre-Nord	18,8	6,9	25,7	12,0	3,1	15,0	30,8	10,0	40,8	36,9	913
Centre-Ouest	22,2	10,6	32,8	6,1	3,8	9,9	28,3	14,5	42,7	23,2	680
Est	16,8	3,0	19,9	12,4	2,1	14,4	29,2	5,1	34,3	42,1	809
Nord	34,1	6,2	40,3	9,1	3,2	12,3	43,2	9,4	52,6	23,4	1 007
Cascades	9,1	8,7	17,8	8,7	7,4	16,1	17,8	16,1	33,9	47,6	314
Hauts-Bassins	25,8	8,3	34,2	10,2	3,8	14,1	36,1	12,2	48,2	29,2	1 224
Sahel	28,4	6,0	34,4	2,5	1,0	3,5	30,8	7,0	37,8	9,2	747
Sud-Ouest	10,9	4,6	15,5	24,0	5,6	29,7	35,0	10,2	45,2	65,6	472
Ensemble	21,8	7,0	28,8	9,9	3,9	13,8	31,7	10,9	42,6	32,3	9 655

¹ Les besoins non-satisfaits pour espacer concernent les femmes enceintes dont la grossesse ne s'est pas produite au moment voulu, les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance ne s'est pas produite au moment voulu, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive et qui ont déclaré vouloir attendre deux ans ou plus avant leur prochaine naissance. Sont également incluses dans les besoins non-satisfaits pour espacer, les femmes qui ne sont pas sûres de vouloir un autre enfant ou qui veulent un autre enfant mais ne savent pas à quel moment elles veulent avoir cet enfant. Les besoins non-satisfaits pour limiter concernent les femmes enceintes dont la grossesse n'était pas voulue, les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance n'était pas voulue, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive et qui ont déclaré ne plus vouloir d'enfants. Sont également exclues les femmes qui sont en ménopause ou en période d'infécondabilité.

² L'utilisation pour espacer concerne les femmes qui utilisent actuellement une méthode contraceptive et qui ont déclaré vouloir un autre enfant ou qui ne sont pas sûres d'en vouloir un autre. L'utilisation pour limiter concerne les femmes qui utilisent actuellement une méthode contraceptive et qui ont déclaré ne plus vouloir d'enfants. Il faut noter que les méthodes spécifiques utilisées ne sont pas prises en compte ici.

³ Besoins non-satisfaits et utilisation actuelle

Tableau D.8.3 Examens au cours des visites prénatales

Pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années précédant l'enquête qui ont bénéficié de soins prénatals pour la naissance la plus récente et qui ont reçu certaines informations et/ou ont subi certains examens au cours des visites, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals									
	Informée des signes de complications de la grossesse	Poids mesuré	Taille mesurée	Tension artérielle mesurée	Urine prélevée	Sang prélevé	Effectif	A reçu du fer en comprimés ou en sirop	A reçu antipaludéens	Effectif des femmes
Ouagadougou	28,2	98,5	92,6	97,6	97,0	87,2	465	87,8	92,7	470
Boucle du Mouhoun	25,9	99,1	97,0	97,2	68,2	25,4	402	70,4	67,6	548
Centre (Sans Ouaga.)	19,5	96,2	91,2	90,7	86,7	39,3	127	77,0	66,2	142
Centre-Sud	6,9	99,2	94,0	99,2	94,9	46,5	401	81,5	64,3	430
Plateau Central	7,5	99,3	98,2	95,9	92,2	34,6	317	78,4	70,3	382
Centre-Est	8,0	98,7	97,2	97,8	85,6	28,7	515	79,5	80,0	615
Centre-Nord	20,3	97,9	95,2	96,5	89,2	25,6	502	68,6	63,8	700
Centre-Ouest	27,8	98,9	97,9	96,6	87,6	29,7	438	77,5	61,7	531
Est	20,7	95,1	94,9	91,8	61,4	17,5	386	56,6	52,9	629
Nord	22,6	96,4	90,4	92,5	69,1	33,9	434	51,4	35,4	807
Cascades	20,4	99,7	98,5	99,2	91,8	69,8	182	76,2	78,8	237
Hauts-Bassins	24,2	99,0	95,3	96,1	76,4	34,2	790	75,8	78,6	975
Sahel	11,6	95,1	91,1	83,1	43,1	11,0	272	50,1	44,2	572
Sud-Ouest	13,8	99,6	97,5	95,8	46,4	28,3	237	59,8	55,3	389
Ensemble	19,2	98,2	95,1	95,5	78,9	36,0	5 468	69,3	64,0	7 428

Tableau D.8.5 Lieu de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, par lieu de l'accouchement et selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Centre de santé					Total	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison	Autre	ND		
Ouagadougou	85,4	9,9	4,7	0,0	0,0	100,0	623
Boucle du Mouhoun	40,5	0,1	59,4	0,0	0,0	100,0	836
Centre (Sans Ouaga.)	57,9	1,4	40,0	0,7	0,0	100,0	204
Centre-Sud	44,3	0,1	55,5	0,1	0,0	100,0	562
Plateau Central	41,4	0,0	58,5	0,1	0,0	100,0	557
Centre-Est	39,5	0,6	59,4	0,2	0,3	100,0	869
Centre-Nord	38,4	0,0	61,6	0,0	0,0	100,0	1 044
Centre-Ouest	42,4	0,7	56,4	0,4	0,1	100,0	764
Est	22,2	0,0	77,2	0,2	0,4	100,0	900
Nord	23,9	0,0	76,1	0,0	0,0	100,0	1 245
Cascades	43,5	0,0	56,5	0,0	0,0	100,0	348
Hauts-Bassins	44,5	1,0	54,3	0,1	0,1	100,0	1 443
Sahel	14,9	0,0	85,1	0,0	0,0	100,0	893
Sud-Ouest	22,0	0,0	77,6	0,3	0,2	100,0	564
Ensemble	37,6	0,8	61,3	0,1	0,1	100,0	10 852

Note : Les données concernent toutes les naissances de la période 0-59 mois précédant l'enquête.

Tableau D.8.6 Assistance lors de l'accouchement

Répartition (en %) des naissances survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, par type d'assistance durant l'accouchement, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Médecin	Infirmière, sage femme	Accou- cheuse tradition- nelle	Parent/ autre	Personne	NSP/ ND	Total	Effectif de naissances
Ouagadougou	8,4	88,5	1,6	1,2	0,2	0,0	100,0	623
Boucle du Mouhoun	0,0	53,8	14,4	27,2	4,6	0,0	100,0	836
Centre (Sans Ouaga.)	2,6	79,8	7,8	7,5	2,3	0,0	100,0	204
Centre-Sud	0,5	82,8	11,3	3,9	1,5	0,0	100,0	562
Plateau Central	0,5	76,6	12,6	7,9	2,4	0,0	100,0	557
Centre-Est	0,4	62,9	25,0	7,4	4,0	0,3	100,0	869
Centre-Nord	0,4	58,0	17,8	18,6	5,1	0,0	100,0	1 044
Centre-Ouest	2,3	65,7	8,3	20,3	3,4	0,0	100,0	764
Est	0,3	41,6	32,4	23,2	2,0	0,4	100,0	900
Nord	1,4	51,5	27,1	13,8	6,2	0,0	100,0	1 245
Cascades	1,0	53,0	9,9	30,7	5,3	0,0	100,0	348
Hauts-Bassins	1,5	51,2	8,2	34,4	4,7	0,0	100,0	1 443
Sahel	0,4	19,9	3,6	51,4	24,7	0,0	100,0	893
Sud-Ouest	1,8	26,5	2,1	59,1	10,4	0,1	100,0	564
Ensemble	1,4	55,1	14,5	23,1	5,9	0,1	100,0	10 852

Note : Les données concernent toutes les naissances de la période 0-59 mois précédant l'enquête. Si l'enquêtée mentionne plus d'une personne ayant assisté l'accouchement, seulement la personne la plus qualifiée est considérée dans ce tableau.

Tableau D.8.7 Caractéristiques de l'accouchement

Pourcentage des naissances survenues au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, selon que l'accouchement a été effectué ou non par césarienne, répartition (en %) du poids de l'enfant à la naissance et la taille de l'enfant à la naissance selon l'estimation par la mère, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Accouchement par césarienne	Poids de l'enfant				Taille de l'enfant à la naissance					Effectif de naissances	
		Non pesé	Moins de 2.5 kg	2.5 kg ou +	NSP/ND	Ensemble	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen/plus gros que la moyenne	NSP/ND		Total
Ouagadougou	3,2	4,9	16,7	69,3	9,0	100,0	5,6	10,4	84,1	0,0	100,0	623
Boucle du Mouhoun	0,7	59,4	4,0	28,5	8,1	100,0	6,0	9,1	84,3	0,7	100,0	836
Centre (Sans Ouaga.)	0,7	38,1	4,7	38,0	19,1	100,0	5,5	8,7	84,2	1,6	100,0	204
Centre-Sud	0,3	55,7	3,9	23,5	16,8	100,0	0,9	8,5	84,1	6,5	100,0	562
Plateau Central	0,7	63,2	3,0	22,7	11,1	100,0	2,3	4,9	89,0	3,9	100,0	557
Centre-Est	0,8	62,3	4,5	24,8	8,4	100,0	4,5	6,6	87,9	1,0	100,0	869
Centre-Nord	0,5	72,3	2,5	14,3	10,8	100,0	3,3	12,9	83,2	0,7	100,0	1 044
Centre-Ouest	0,8	58,9	4,3	23,8	13,0	100,0	8,3	7,5	83,5	0,7	100,0	764
Est	0,1	77,7	3,1	14,0	5,2	100,0	8,2	17,9	69,1	4,8	100,0	900
Nord	0,3	79,1	1,4	10,5	9,0	100,0	6,8	6,7	86,0	0,5	100,0	1 245
Cascades	0,2	53,1	5,4	34,4	7,1	100,0	1,3	13,0	85,6	0,1	100,0	348
Hauts-Bassins	0,8	54,9	5,4	29,1	10,6	100,0	2,2	8,7	88,8	0,3	100,0	1 443
Sahel	0,1	84,7	2,0	7,4	6,0	100,0	30,1	9,9	60,0	0,0	100,0	893
Sud-Ouest	0,6	77,0	2,1	12,5	8,4	100,0	8,7	11,2	79,5	0,6	100,0	564
Ensemble	0,7	63,3	4,2	22,9	9,6	100,0	7,0	9,7	82,0	1,3	100,0	10 852

Note : Les données concernent toutes les naissances de la période 0-59 mois précédant l'enquête.

Tableau D.8.8 Soins postnatals

Répartition (en %) des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, dont la mère n'a pas accouché dans un établissement sanitaire, en fonction du moment des soins postnatals pour la naissance la plus récente, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Moment auquel a été effectué le premier examen postnatal				N'a pas reçu un examen postnatal	Total	Effectif
	Dans les deux jours après accouchement	3-6 jours après accouchement	7-41 jours après accouchement	NSP/ ND			
Ouagadougou	*	*	*	*	*	*	23
Boucle du Mouhoun	12,4	2,3	2,6	0,0	82,8	100,0	311
Centre (Sans Ouaga.)	17,0	5,2	11,9	4,3	61,7	100,0	55
Centre-Sud	8,5	5,4	19,8	0,6	65,8	100,0	237
Plateau Central	9,8	6,0	18,2	0,1	66,0	100,0	223
Centre-Est	9,5	5,3	20,2	1,9	63,0	100,0	359
Centre-Nord	10,9	2,3	11,2	4,3	71,3	100,0	425
Centre-Ouest	30,5	7,0	10,9	2,3	49,3	100,0	293
Est	5,1	0,7	6,3	6,3	81,6	100,0	483
Nord	15,1	4,4	6,3	0,9	73,4	100,0	606
Cascades	18,3	5,1	3,0	1,0	72,6	100,0	126
Hauts-Bassins	18,8	4,6	5,3	0,9	70,4	100,0	504
Sahel	1,9	0,2	2,5	0,5	94,9	100,0	481
Sud-Ouest	6,1	1,8	4,1	0,4	87,6	100,0	297
Ensemble	12,0	3,4	8,6	1,8	74,1	100,0	4 421

Note : Les données concernent les dernières naissances de la période 0-59 mois précédant l'enquête.

* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

Tableau D.8.9 Personne consultée pour les soins postnatals

Répartition (en %) des femmes qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, dont la mère n'a pas accouché dans un établissement sanitaire, par type de personne consultée pour les soins postnatals, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Personne ayant effectué l'examen postnatal					N'a pas reçu un examen postnatal	Total	Effectif
	Médecin	Infirmière/ sage femme	Accoucheuse traditionnelle	Autre	NSP/ND			
Ouagadougou	*	*	*	*	*	*	100,0	23
Boucle du Mouhoun	0,0	16,0	1,0	0,0	0,3	82,8	100,0	311
Centre (Sans Ouaga.)	1,3	35,3	0,0	0,0	1,8	61,7	100,0	55
Centre-Sud	0,8	32,7	0,8	0,0	0,0	65,8	100,0	237
Plateau Central	0,2	32,3	0,9	0,4	0,2	66,0	100,0	223
Centre-Est	0,5	36,4	0,0	0,0	0,0	63,0	100,0	359
Centre-Nord	0,3	23,6	4,5	0,2	0,0	71,3	100,0	425
Centre-Ouest	1,3	47,7	1,5	0,0	0,2	49,3	100,0	293
Est	0,3	16,5	1,6	0,0	0,0	81,6	100,0	483
Nord	0,3	22,1	3,2	0,3	0,7	73,4	100,0	606
Cascades	0,8	26,6	0,0	0,0	0,0	72,6	100,0	126
Hauts-Bassins	0,4	25,9	3,3	0,0	0,0	70,4	100,0	504
Sahel	0,0	4,8	0,3	0,0	0,0	94,9	100,0	481
Sud-Ouest	2,3	9,7	0,2	0,0	0,2	87,6	100,0	297
Ensemble	0,6	23,3	1,7	0,1	0,2	74,1	100,0	4 421

Note : Les données concernent les dernières naissances de la période 0-59 mois précédant l'enquête, dont la mère n'a pas accouché dans un établissement sanitaire.

* Basé sur trop peu de cas non-pondérés.

Tableau D.8.12 Vaccinations selon les caractéristiques socio-démographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu chaque vaccin (selon le carnet de vaccination ou les déclarations de la mère) et pourcentage de ceux pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	DTCoq				Polio ¹				Rougeole	Tous vaccins ²	Aucun vaccin	Fièvre jaune	Tous vaccins avec fièvre jaune	Pourcentage avec carnet de vaccination	Effectif d'enfants vivants
	BCG	1	2	3	0	1	2	3							
Ouagadougou	96,4	86,9	80,4	70,7	93,2	89,3	78,9	78,9	73,1	68,4	3,6	63,7	63,7	84,6	90
Boucle du Mouhoun	91,9	88,7	75,3	63,6	81,4	95,4	80,8	66,4	60,2	50,1	2,9	50,4	45,2	83,0	161
Centre (Sans Ouaga.)	92,7	90,0	82,5	75,1	88,7	93,4	87,3	64,7	64,5	52,1	5,1	51,2	48,6	75,2	45
Centre-Sud	88,3	81,2	75,6	58,5	73,9	85,7	79,0	64,6	65,6	51,9	11,7	53,4	46,9	66,5	92
Plateau Central	76,1	72,1	64,1	57,1	69,5	77,5	67,5	56,8	50,1	44,8	20,5	45,6	43,8	63,3	102
Centre-Est	77,6	77,8	64,9	59,4	67,7	80,5	70,0	58,8	62,8	43,9	9,3	50,8	40,7	73,6	157
Centre-Nord	88,4	86,7	80,1	72,4	73,9	92,0	83,9	69,4	69,2	59,1	7,5	54,6	53,3	69,3	187
Centre-Ouest	84,9	78,6	71,1	55,5	74,1	89,8	79,7	57,5	51,6	36,0	6,8	42,0	31,8	72,0	117
Est	78,6	75,3	69,1	57,3	60,6	83,8	78,9	59,6	51,9	43,9	13,6	41,2	37,4	59,1	131
Nord	77,3	68,3	54,2	36,7	59,0	91,2	66,3	40,3	47,3	27,6	5,0	29,2	21,9	58,4	204
Cascades	80,9	81,4	78,2	66,1	73,1	84,2	78,4	64,7	64,8	51,7	14,0	52,1	45,7	69,5	66
Hauts Basins	69,9	65,8	60,5	52,6	63,8	78,8	68,0	55,2	47,7	38,2	14,8	39,6	35,5	61,4	258
Sahel	65,7	56,1	45,0	39,3	45,9	83,0	61,4	40,9	33,7	23,2	8,4	31,1	21,4	51,7	141
Sud-Ouest	90,4	82,7	76,8	66,0	64,1	92,3	85,2	70,0	65,0	53,3	7,0	50,6	42,7	62,2	89
Ensemble	80,9	76,1	67,5	57,0	68,5	86,5	74,5	58,7	55,8	43,9	9,4	44,9	39,4	66,7	1 840

Note : Basé sur les deux sources.

¹ Polio 0 est la vaccination de polio donnée à la naissance.

² Enfants complètement vaccinés (c'est à dire ceux qui ont reçu le BCG, la rougeole, les trois doses de DTCoq et de polio (non-compris polio 0)).

Tableau D.8.14 Prévalence et traitement des infections respiratoires aiguës (IRA) et/ou fièvre

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont souffert de la toux avec une respiration courte et rapide (symptômes des IRA) et pourcentage de ceux qui ont eu de la fièvre au cours des deux semaines qui ont précédé l'enquête, pourcentage de ceux ayant les symptômes des IRA ou de la fièvre pour lesquels un traitement auprès d'un service de santé a été demandé, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Pourcentage d'enfants avec les symptômes de l'IRA	Pourcentage d'enfants avec fièvre	Effectif d'enfants vivants	% traités au centre de santé ou par agent de santé	Effectif d'enfants qui ont eu des IRA ou de la fièvre
Ouagadougou	7,7	18,6	564	60,8	120
Boucle du Mouhoun	7,1	34,0	743	25,3	267
Centre (Sans Ouaga.)	10,1	28,6	189	33,1	62
Centre-Sud	6,4	27,2	520	38,2	149
Plateau Central	9,4	43,4	506	35,0	225
Centre-Est	10,8	43,5	793	38,8	372
Centre-Nord	5,8	39,9	880	34,7	357
Centre-Ouest	13,1	40,1	655	34,7	281
Est	4,8	28,4	794	46,0	235
Nord	14,4	37,3	1 050	29,3	427
Cascades	7,8	34,0	301	34,7	107
Hauts-Bassins	5,7	38,9	1 260	29,2	502
Sahel	8,0	55,1	730	16,8	404
Sud-Ouest	10,0	28,1	496	31,3	156
Ensemble	8,6	36,7	9 477	32,6	3 665

IRA = Infection respiratoire aigüe

Tableau D.8.17 Prévalence de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage de ceux qui ont eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Diarrhée des deux semaines avant l'enquête	Effectif des enfants
Ouagadougou	23,5	564
Boucle du Mouhoun	19,0	743
Centre (Sans Ouaga.)	27,0	189
Centre-Sud	15,2	520
Plateau Central	18,4	506
Centre-Est	24,2	793
Centre-Nord	17,5	880
Centre-Ouest	22,0	655
Est	13,8	794
Nord	25,7	1 050
Cascades	16,1	301
Hauts-Bassins	17,1	1 260
Sahel	34,0	730
Sud-Ouest	16,9	496
Ensemble	20,7	9 477

Note : Les données sont calculés sur les enfants vivants et décédés.

Tableau D.8.19 Traitement de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans qui ont eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, pourcentage de ceux qui ont été menés en consultation dans un établissement sanitaire ou auprès de personnel de santé, pourcentage de ceux qui ont suivi une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), et pourcentage de ceux qui ont reçu d'autres traitements, selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Pourcentage amenés à un centre de santé	Thérapie de Réhydratation Orale (TRO)					Autres traitements					Effectif des enfants
		Sachets de SRO	Solution maison	SRO ou solution maison	Augmentation de l'apport en liquides	SRO, Solution maison, ou augmentation des liquides	Gélules ou sirop	Injection	Perfusion	Remède maison/ autre	Aucun traitement	
Ouagadougou	35,4	23,8	24,0	44,9	49,0	71,9	46,8	1,6	0,0	17,8	8,7	132
Boucle du Mouhoun	17,4	15,3	4,3	17,6	55,0	61,1	7,2	0,8	0,0	58,7	10,1	141
Centre (Sans Ouaga.)	23,6	18,2	7,1	24,2	60,5	69,7	24,5	0,0	0,0	42,6	7,2	51
Centre-Sud	12,3	19,8	20,6	39,2	51,4	80,3	21,7	0,0	1,3	15,3	9,7	79
Plateau Central	14,9	15,3	14,7	29,1	43,6	60,5	19,9	1,1	0,0	29,9	23,2	93
Centre-Est	19,7	24,9	17,5	39,9	45,3	63,4	15,7	1,8	0,0	21,0	19,2	192
Centre-Nord	20,7	15,1	4,0	19,1	54,0	66,2	27,7	0,0	0,0	45,7	9,6	154
Centre-Ouest	16,7	23,5	5,0	25,9	45,1	59,8	25,9	0,6	0,4	41,3	14,2	144
Est	29,4	17,0	25,2	39,0	35,5	61,4	22,7	0,0	0,0	60,7	10,6	109
Nord	10,6	18,1	4,6	19,6	52,5	64,8	27,1	0,0	0,0	36,6	12,9	270
Cascades	(17,1)	(24,9)	(10,5)	(33,6)	(46,2)	(67,2)	(5,8)	(0,0)	(0,0)	(47,8)	(9,0)	48
Hauts-Bassins	16,2	25,9	12,5	31,7	74,9	81,6	7,7	0,0	0,0	37,4	8,4	215
Sahel	9,1	8,3	0,4	8,3	25,4	31,7	11,3	0,0	0,0	40,7	31,9	248
Sud-Ouest	11,8	20,3	6,8	26,0	52,4	67,6	18,5	0,6	0,0	35,6	14,7	84
Ensemble	17,2	18,9	10,0	26,5	49,0	62,8	20,0	0,5	0,1	37,6	14,8	1 961

() Basé sur un faible nombre de cas non-pondérés.

Tableau D.9.8 Consommation de micronutriments

Pourcentage des derniers-nés âgés de moins de trois ans et vivant avec leurs mères, et dont les mères ont reçu des aliments riches en vitamine A au cours des sept jours qui ont précédé l'enquête, pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont reçu des compléments de vitamine A au cours des six mois qui ont précédé l'enquête, et pourcentage des enfants de moins de cinq ans vivant dans des ménages ayant un sel adéquatement iodé, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	A consommé des fruits et légumes riches en vitamine A	Effectif de derniers-nés ¹	A reçu des compléments de vitamine A	Effectif d'enfants ²	% vivant dans les ménages utilisant du sel adéquatement iodé ³	Effectif d'enfants ⁴
Ouagadougou	37,1	279	50,4	508	69,3	531
Boucle du Mouhoun	27,3	410	34,9	654	53,8	733
Centre (Sans Ouaga.)	21,9	113	34,6	165	56,6	184
Centre-Sud	37,9	293	38,9	472	25,3	520
Plateau Central	19,9	289	35,6	460	29,3	479
Centre-Est	21,5	473	29,2	704	63,0	766
Centre-Nord	18,2	536	33,1	750	24,5	879
Centre-Ouest	21,7	369	38,7	580	62,2	624
Est	34,5	444	7,8	696	46,5	786
Nord	22,3	628	42,6	917	26,5	1 045
Cascades	23,5	169	27,3	272	80,6	298
Hauts-Bassins	32,3	723	34,7	1 101	91,9	1 252
Sahel	12,3	399	25,6	631	14,4	717
Sud-Ouest	27,5	275	34,9	432	35,8	478
Ensemble	25,5	5 401	33,3	8 342	48,8	9 292

Note : Les aliments riches en vitamine A comprennent : potiron, igname ou courge rouge ou jaune, carottes, patate douce, légumes à feuilles vertes, mangue, papaye, viande, volaille, poisson, œuf.

¹ Enfants derniers-nés de moins de 3 ans

² Enfants de moins de 5 des femmes enquêtées

³ Le sel contient 15 ppm d'iode ou plus. Sont exclus les enfants qui vivent dans des ménages dont le sel n'a pas été testé

⁴ Enfants de moins de 5 ans vivants dans les ménages

Tableau D.9.10 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Répartition (en %) des enfants âgés de 6-59 mois considérés comme ayant une forme d'anémie, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Ayant une anémie	Pourcentage d'enfants anémiés			Effectif des enfants
		Légère (10.0-10.9 g/dl)	Modérée (7.0-9.9 g/dl)	Sévère (en dessous de 7.0 g/dl)	
Ouagadougou	71,4	25,6	43,3	2,5	139
Boucle du Mouhoun	97,0	12,2	63,4	21,4	231
Centre (Sans Ouaga.)	86,7	30,6	54,4	1,7	40
Centre-Sud	92,4	27,0	62,0	3,4	163
Plateau Central	94,6	11,6	65,1	17,9	171
Centre-Est	95,2	19,8	57,4	17,9	241
Centre-Nord	95,3	20,4	60,8	14,1	268
Centre-Ouest	95,3	17,7	63,5	14,1	175
Est	86,8	36,6	49,6	0,6	238
Nord	91,0	15,9	58,7	16,4	321
Cascades	95,9	11,8	66,4	17,7	85
Hauts-Bassins	88,5	16,7	58,5	13,3	352
Sahel	95,6	6,4	68,8	20,4	213
Sud-Ouest	88,5	15,9	67,4	5,2	146
Ensemble	91,5	18,6	59,9	13,0	2 786

Note : Le tableau est basé sur les enfants qui ont dormi dans le ménage la nuit précédant l'interview. La prévalence est ajustée pour l'altitude en utilisant la formule dans CDC, 1998.
g/dl = grammes par décilitre

Tableau D.9.11 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans ayant une forme d'anémie, selon région, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Ayant une anémie	Statut d'anémie			Effectif de femmes
		Anémie légère (10,0 - 10,9 g/dl)	Anémie modérée (7,0 - 9,9 g/dl)	Anémie sévère (en dessous de 7,0 g/dl)	
Ouagadougou	47,5	36,2	11,3	0,0	457
Boucle du Mouhoun	51,8	35,1	15,1	1,6	314
Centre (Sans Ouaga.)	43,4	33,2	9,2	0,9	73
Centre-Sud	46,0	30,4	15,6	0,0	247
Plateau Central	59,0	41,6	16,5	0,9	221
Centre-Est	60,5	36,0	21,5	3,0	377
Centre-Nord	56,1	41,3	14,0	0,8	358
Centre-Ouest	58,9	41,7	16,7	0,5	319
Est	44,1	33,7	10,1	0,4	301
Nord	57,4	42,6	14,0	0,8	406
Cascades	56,1	35,7	18,0	2,5	134
Hauts-Bassins	55,8	39,7	15,1	1,0	572
Sahel	62,4	41,4	17,5	3,5	290
Sud-Ouest	39,6	31,6	7,8	0,2	202
Ensemble	53,7	37,8	14,7	1,1	4 271

Note : Les femmes avec un taux d'hémoglobine <7,0 g/dl ont une anémie sévère, les femmes avec un taux entre 7,0 et 9,9 ont une anémie modérée, et les femmes enceintes avec un taux de 10,0 et 10,9 g/dl et les femmes non enceintes qui ont un taux entre 10,0 et 11,9 g/dl ont une anémie bénigne.

Tableau D.12.10.1 Avantages pour une fille de ne pas être excisée : femmes

Pourcentage de femmes qui ont évoqué différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Avantages de ne pas être excisée							Effectif qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Moins de problème de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion	Autre	
Ouagadougou	18,8	55,2	34,5	14,0	11,2	0,8	7,2	1 403
Boucle du Mouhoun	24,4	32,5	39,7	2,9	1,5	0,9	0,7	905
Centre (Sans Ouaga.)	30,6	45,0	31,5	3,0	2,1	0,7	2,6	233
Centre-Sud	15,1	63,9	41,2	3,9	1,8	0,4	0,1	661
Plateau Central	33,6	29,2	13,7	1,3	1,4	0,0	1,4	598
Centre-Est	59,4	33,0	11,3	2,7	1,2	0,1	0,9	1 033
Centre-Nord	27,8	30,4	21,5	2,0	1,3	0,2	1,4	1 023
Centre-Ouest	27,8	36,4	13,7	1,5	0,9	1,6	1,5	866
Est	9,0	59,0	52,1	2,8	1,8	0,0	0,8	874
Nord	29,8	23,9	17,5	1,6	1,7	1,1	0,1	1 100
Cascades	15,5	52,5	43,1	6,5	1,6	2,8	1,0	403
Hauts-Bassins	31,3	34,4	23,7	4,0	3,5	0,6	1,2	1 590
Sahel	28,5	24,0	8,4	0,5	0,8	4,2	5,7	792
Sud-Ouest	21,2	42,6	24,5	2,1	1,4	0,0	0,5	580
Ensemble	27,5	39,1	26,0	3,9	2,8	0,9	2,0	12 060

Note : La somme des pourcentages pas avantage cité peut dépasser 100 % car une femme peut citer plusieurs avantages.

Tableau D.12.10.2 Avantages pour une fille de ne pas être excisée : hommes

Pourcentage de hommes qui ont évoqué différents avantages pour une fille de ne pas être excisée, selon les caractéristiques socio-démographiques, EDSBF-III Burkina Faso 2003

Région	Avantages de ne pas être excisée							Effectif qui connaissent l'excision
	Pas d'avantage	Moins de problème de santé	Évite la souffrance	Plus grand plaisir de la femme	Plus grand plaisir de l'homme	En accord avec la religion	Autre	
Ouagadougou	14,0	64,0	36,2	20,2	10,8	1,4	10,6	461
Boucle du Mouhoun	17,0	59,6	22,8	1,6	3,1	1,2	0,8	237
Centre (Sans Ouaga.)	20,0	58,6	22,0	14,4	6,6	4,6	0,6	71
Centre-Sud	7,5	58,7	15,1	9,4	2,1	1,0	1,9	202
Plateau Central	11,6	36,0	21,9	4,2	3,1	0,0	0,4	173
Centre-Est	29,9	67,6	2,6	17,6	6,6	0,4	0,9	243
Centre-Nord	7,9	50,8	29,9	5,4	2,3	0,5	0,1	239
Centre-Ouest	34,7	41,1	3,8	1,9	0,0	0,6	3,5	209
Est	21,1	57,7	28,2	1,7	0,8	0,5	0,0	251
Nord	11,5	58,3	21,7	5,4	3,4	3,1	4,6	256
Cascades	12,2	81,3	40,2	8,1	9,5	1,1	3,2	120
Hauts-Bassins	20,7	50,3	31,7	11,0	4,6	0,9	2,5	520
Sahel	31,0	43,4	16,8	2,2	5,7	8,1	1,1	221
Sud-Ouest	5,0	79,8	77,5	4,7	3,2	0,4	6,0	163
Ensemble	17,8	56,7	26,6	8,6	4,7	1,5	3,1	3 366

Note : La somme des pourcentages peut dépasser 100 % car un homme peut citer plusieurs avantages.