

ANNEXE B

ERREURS DE SONDAGE

Les estimations obtenues à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types d'erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en oeuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour minimiser ce type d'erreur pendant la mise en oeuvre de l'EDSBF-II, il est difficile d'éviter et d'évaluer toutes les erreurs de mesure.

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. Les estimations qui figurent dans ce rapport ont été obtenues à partir d'un échantillon de 6 445 femmes âgées de 15 à 49 ans. Si l'enquête avait été effectuée auprès d'un autre échantillon de femmes, il y a tout lieu de penser que les fréquences des réponses auraient été très peu différentes de celles présentées ici. C'est l'incertitude de cette assumption que reflète l'erreur de sondage; celle-ci permet donc de mesurer le degré de variation des réponses d'un échantillon à un autre.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur de sondage d'un paramètre (moyenne, proportion ou taux). Elle est estimée à partir de la variance des réponses dans l'échantillon même : l'erreur-type est la racine carrée de la variance.

Si l'échantillon de femmes avait été tiré d'après un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer les erreurs de sondage. Cependant, l'échantillon de l'EDSBF-II étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, des formules plus complexes ont été utilisées. Le module « erreurs de sondage » du logiciel ISSA a été utilisé pour calculer les erreurs de sondage suivant la méthodologie statistique appropriée. Ce module utilise la méthode de linéarisation (Taylor) pour des estimations telles que les moyennes ou proportions, et la méthode de Jackknife pour des estimations plus complexes tels que l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio, $r=y/x$, avec y la valeur du paramètre pour l'échantillon total, et x le nombre total de cas dans l'ensemble (ou sous-ensemble) de l'échantillon. La variance de r est estimée par :

$$ET^2(r) \approx var(r) \approx \frac{1}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_h+1} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} + r \cdot x_{hi} \quad \text{et} \quad z_h = y_h + r \cdot x_h$$

où h représente la strate qui va de 1 à H ,
 m_h est le nombre total de grappes tirées dans la strate h ,
 y_{hi} est la somme des valeurs pondérées du paramètre y dans la grappe i de la strate h ,
 x_{hi} est la somme des nombres pondérés de cas dans la grappe i de la strate h , et
 f est le taux global de sondage qui est négligeable.

La méthode de Jackknife dérive les estimations des taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal, et calcule les variances de ces estimations avec des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut *une* grappe dans les calculs des estimations. Ainsi, des sous-échantillons pseudo-indépendants ont été créés. Dans l'EDSBF-II, il y a 210 grappes non-vides. Par conséquent, 210 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux r est calculé de la façon suivante :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

dans laquelle

$$r_i = kr + (k-1)r_{(i)}$$

où r est l'estimation calculée à partir de l'échantillon principal de 210 grappes,
 $r_{(i)}$ est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 209 grappes ($i^{\text{ème}}$ grappe exclue),
 k est le nombre total de grappes.

Il existe un deuxième indice très utile qui est la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) ou effet de grappe : c'est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Cet indice révèle dans quelle mesure le plan de sondage qui a été choisi se rapproche d'un échantillon aléatoire simple de même taille : la valeur 1 de la REPS indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un échantillon aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1 indique un accroissement de l'erreur de sondage dû à un plan de sondage plus complexe et moins efficace au point de vue statistique. Le logiciel calcule aussi l'erreur relative et l'intervalle de confiance pour chaque estimation.

Les erreurs de sondage pour l'EDSBF-II ont été calculées pour certaines des variables les plus intéressantes. Les résultats sont présentés dans cet annexe pour l'ensemble du pays, le milieu urbain, le milieu rural, Ouagadougou, le Nord, l'Est, l'Ouest, et l'ensemble formé par le Centre et le Sud. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion ou taux) et la population de base sont présentés dans le tableau B.1. Les tableaux B.2 à B.9 présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non-pondérés (N) et pondérés (N'), la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95 % (M±2ET) pour chaque variable. L'effet du plan de sondage (REPS) est non-défini quand l'écart-type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1). Dans le cas de l'indice synthétique de fécondité, le nombre de cas non-pondérés n'est pas pertinent, car la valeur non-pondérée de femmes-années d'exposition au risque de grossesse n'est pas connue.

L'intervalle de confiance est interprété de la manière suivante : pour la variable *Enfants nés vivants aux femmes 15-49 ans*, l'EDSBF-II a donné un nombre moyen d'enfants nés vivants de 3,567 pour l'ensemble des femmes, auquel correspond une erreur-type de 0,039 enfant. Dans 95 % des échantillons de taille et caractéristique identiques, la valeur réelle du nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes âgées de 15 à 49 ans se trouve entre 3,567 - 2x0,039 et 3,567 + 2x0,039, soit 3,489 et 3,645.

Les erreurs de sondage ont été analysées pour l'échantillon national de femmes et pour deux groupes d'estimations : (1) moyennes et proportions, et (2) taux démographiques. Les erreurs relatives (ET/M) des moyennes et proportions se situent entre 0,8 % et 38,3 % avec une moyenne de 7,3 %. Les erreurs relatives les plus élevées sont généralement celles des très faibles estimations (par exemple, parmi les femmes

actuellement en union qui *Utilisent la stérilisation féminine*). Si on enlève les estimations de très faible valeur (moins de 10 %), la moyenne tombe à 3,7 %. Ainsi, en général, les erreurs relatives de la plupart des estimations pour l'ensemble du pays sont faibles, sauf dans le cas de très faibles proportions. L'erreur relative de l'indice de fécondité est assez faible 1,6 %. Cependant, pour les taux de mortalité, l'erreur relative moyenne est un peu plus élevée 5,2 %.

Il existe des différences entre les erreurs relatives au niveau des sous-échantillons. Par exemple, pour la variable *Enfants nés vivants aux femmes âgées de 40 à 49 ans*, l'erreur relative pour l'échantillon de femmes est, respectivement, de 1,3 %, 3,3 % et 3,7 % pour l'ensemble du pays, la capitale Ouagadougou et l'Ouest du pays.

Pour l'échantillon national de femmes, la moyenne de la racine carrée de l'effet du plan de sondage (REPS) calculée pour l'ensemble des estimations est de 1,4 ce qui veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur de sondage est multipliée en moyenne par un facteur de 1,4 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappes et à plusieurs degrés).

Tableau B.1 Variables utilisées pour le calcul des erreurs de sondage, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Estimation	Population de base
FEMMES		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Sans instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Instruction post-primaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Jamais mariée (en union)	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Actuellement mariée (en union)	Proportion	Toutes les femmes 15-49
Mariée (en union) avant 20 ans	Proportion	Femmes 20-49
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	Proportion	Femmes 20-49
Enfants nés vivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Enfants nés vivants des femmes 40-49	Moyenne	Femmes 40-49
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Connaît une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
A utilisé une méthode	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement les injections	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement le norplan	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement le condom	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement la stérilisation masculine	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise la continence périodique	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Utilise source publique	Proportion	Utilisatrices de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfants	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Veut retarder d'au moins 2 ans	Proportion	Femmes actuellement en union 15-49
Taille de famille idéale	Moyenne	Toutes les femmes 15-49
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	Proportion	Naissances, 5 dernières années
Assistance médicale à l'accouchement	Proportion	Naissances, 5 dernières années
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
A reçu traitement SRO	Proportion	Enfants de moins de 5 ans, avec diarrhée les 2 dernières semaines
A consulté du personnel médical	Proportion	Enfants de moins de 5 ans, avec diarrhée les 2 dernières semaines
Ayant une carte de santé	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination BCG	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination DTC (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
A reçu vaccination rougeole	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
Vacciné contre toutes les maladies	Proportion	Enfants âgés 12-23 mois
Poids-pour-taille	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Taille-pour-âge	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Poids pour âge	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
HOMMES		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-54
Sans instruction	Proportion	Tous les hommes 15-54
Instruction post-primaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-54
Jamais mariée (en union)	Proportion	Tous les hommes 15-54
Actuellement mariée (en union)	Proportion	Tous les hommes 15-54
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Connaît une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
A utilisé une méthode	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement les injections	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement le norplan	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement le condom	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement la stérilisation masculine	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise la continence périodique	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Ne veut plus d'enfants	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Veut retarder d'au moins 2 ans	Proportion	Hommes actuellement en union 15-54
Taille de famille idéale	Moyenne	Tous les hommes 15-54

Tableau B.2 Erreurs de sondage - Échantillon national, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _p)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,169	0,008	6445	6445	1,759	0,049	0,152	0,185
Sans instruction	0,858	0,007	6445	6445	1,705	0,009	0,843	0,873
Instruction post-primaire ou plus	0,058	0,005	6445	6445	1,685	0,085	0,048	0,068
Jamais mariée (en union)	0,169	0,006	6445	6445	1,328	0,037	0,156	0,181
Actuellement mariée (en union)	0,804	0,007	6445	6445	1,333	0,008	0,791	0,817
Mariée (en union) avant 20 ans	0,845	0,007	4971	5001	1,387	0,008	0,831	0,859
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,676	0,009	4971	5001	1,316	0,013	0,659	0,694
Enfants nés vivants	3,567	0,039	6445	6445	1,008	0,011	3,489	3,645
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,427	0,095	1078	1103	1,190	0,013	7,238	7,616
Enfants survivants	2,713	0,027	6445	6445	0,900	0,010	2,660	2,767
Connaît une méthode contraceptive	0,792	0,014	5034	5181	2,448	0,018	0,764	0,820
Connaît une méthode moderne	0,772	0,014	5034	5181	2,420	0,019	0,744	0,801
A utilisé une méthode	0,251	0,012	5034	5181	2,003	0,049	0,226	0,275
Utilise actuellement une méthode	0,119	0,008	5034	5181	1,673	0,064	0,103	0,134
Utilise actuellement une méthode moderne	0,048	0,004	5034	5181	1,284	0,080	0,041	0,056
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,002	5034	5181	1,141	0,118	0,014	0,023
Utilise actuellement le DIU	0,004	0,001	5034	5181	1,019	0,227	0,002	0,006
Utilise actuellement les injections	0,011	0,001	5034	5181	1,029	0,139	0,008	0,014
Utilise actuellement le Norplant	0,002	0,001	5034	5181	0,890	0,277	0,001	0,003
Utilise actuellement le condom	0,012	0,002	5034	5181	1,007	0,131	0,009	0,015
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,000	5034	5181	0,802	0,383	0,000	0,002
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	5034	5181	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,046	0,005	5034	5181	1,534	0,098	0,037	0,055
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	5034	5181	1,015	0,298	0,001	0,004
Utilise source publique	0,530	0,026	480	376	1,135	0,049	0,478	0,582
Ne veut plus d'enfants	0,196	0,008	5034	5181	1,357	0,039	0,180	0,211
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,444	0,009	5034	5181	1,319	0,021	0,426	0,463
Taille de famille idéale	5,713	0,075	5160	5091	2,190	0,013	5,564	5,863
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,535	0,018	5953	6218	2,372	0,033	0,499	0,571
Assistance médicale à l'accouchement	0,309	0,019	5953	6218	2,733	0,062	0,271	0,348
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,200	0,008	5076	5286	1,472	0,042	0,183	0,216
A reçu traitement SRO	0,146	0,011	1015	1055	1,014	0,078	0,124	0,169
A consulté du personnel médical	0,189	0,014	1015	1055	1,086	0,071	0,162	0,216
Ayant une carte de santé	0,559	0,028	1001	1041	1,770	0,049	0,504	0,614
A reçu vaccination BCG	0,723	0,025	1001	1041	1,757	0,034	0,673	0,772
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,368	0,025	1001	1041	1,656	0,069	0,318	0,418
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,424	0,024	1001	1041	1,510	0,055	0,377	0,472
A reçu vaccination rougeole	0,458	0,024	1001	1041	1,512	0,052	0,410	0,505
Vacciné contre toutes les maladies	0,276	0,022	1001	1041	1,552	0,080	0,232	0,320
Poids-pour-taille	0,132	0,007	3690	3791	1,301	0,055	0,117	0,146
Taille-pour-âge	0,368	0,009	3690	3791	1,127	0,025	0,350	0,386
Poids-pour-âge	0,343	0,009	3690	3791	1,135	0,026	0,326	0,361
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,803	0,108	NA	28420	1,355	0,016	6,587	7,019
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	40,779	2,876	6070	6341	1,073	0,071	35,027	46,532
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	105,340	4,962	6102	6373	1,192	0,047	95,415	115,265
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	126,928	5,845	6351	6645	1,333	0,046	115,239	138,618
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	218,898	7,805	6383	6676	1,417	0,036	203,288	234,507
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	64,560	3,809	6102	6373	1,166	0,059	56,943	72,178
HOMMES								
Milieu urbain	0,220	0,011	2641	2641	1,425	0,052	0,197	0,243
Sans instruction	0,735	0,013	2641	2641	1,533	0,018	0,709	0,762
Instruction post-primaire ou plus	0,124	0,011	2641	2641	1,678	0,087	0,102	0,145
Jamais mariée (en union)	0,411	0,012	2641	2641	1,238	0,029	0,387	0,435
Actuellement mariée (en union)	0,570	0,012	2641	2641	1,215	0,021	0,546	0,593
Connaît une méthode contraceptive	0,934	0,009	1458	1505	1,406	0,010	0,916	0,952
Connaît une méthode moderne	0,922	0,010	1458	1505	1,379	0,010	0,903	0,942
A utilisé une méthode	0,570	0,024	1458	1505	1,859	0,042	0,522	0,619
Utilise actuellement une méthode	0,395	0,022	1458	1505	1,733	0,056	0,351	0,440
Utilise actuellement une méthode moderne	0,133	0,011	1458	1505	1,221	0,082	0,111	0,154
Utilise actuellement la pilule	0,029	0,004	1458	1505	0,956	0,145	0,021	0,038
Utilise actuellement le DIU	0,006	0,002	1458	1505	1,072	0,373	0,001	0,010
Utilise actuellement les injections	0,008	0,002	1458	1505	0,993	0,290	0,003	0,013
Utilise actuellement le Norplant	0,003	0,001	1458	1505	0,909	0,426	0,000	0,006
Utilise actuellement le condom	0,083	0,009	1458	1505	1,178	0,102	0,066	0,101
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	1458	1505	0,989	0,722	0,000	0,003
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,001	0,001	1458	1505	1,074	1,004	0,000	0,002
Utilise la continence périodique	0,234	0,018	1458	1505	1,636	0,078	0,198	0,270
Utilise actuellement le retrait	0,005	0,002	1458	1505	1,069	0,386	0,001	0,009
Ne veut plus d'enfants	0,103	0,009	1458	1505	1,087	0,084	0,086	0,121
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,510	0,017	1458	1505	1,280	0,033	0,477	0,544
Taille de famille idéale	6,984	0,141	2242	2225	1,359	0,020	6,702	7,267

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.3 Erreurs de sondage - Échantillon urbain, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	1651	1086	NA	0,000	1,000	1,000
Sans instruction	0,469	0,026	1651	1086	2,089	0,055	0,418	0,520
Instruction post-primaire ou plus	0,314	0,025	1651	1086	2,169	0,079	0,264	0,363
Jamais mariée (en union)	0,347	0,015	1651	1086	1,310	0,044	0,316	0,378
Actuellement mariée (en union)	0,601	0,016	1651	1086	1,360	0,027	0,569	0,634
Mariée (en union) avant 20 ans	0,598	0,021	1186	777	1,502	0,036	0,556	0,641
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,507	0,020	1186	777	1,362	0,039	0,468	0,547
Enfants nés vivants	2,305	0,073	1651	1086	1,131	0,032	2,158	2,452
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,296	0,166	209	141	0,980	0,026	5,963	6,629
Enfants survivants	1,944	0,054	1651	1086	0,998	0,028	1,835	2,053
Connaît une méthode contraceptive	0,978	0,008	984	653	1,629	0,008	0,963	0,993
Connaît une méthode moderne	0,976	0,009	984	653	1,821	0,009	0,959	0,994
A utilisé une méthode	0,568	0,021	984	653	1,351	0,038	0,525	0,610
Utilise actuellement une méthode	0,294	0,019	984	653	1,321	0,065	0,256	0,333
Utilise actuellement une méthode moderne	0,201	0,015	984	653	1,194	0,076	0,171	0,232
Utilise actuellement la pilule	0,083	0,010	984	653	1,082	0,114	0,064	0,102
Utilise actuellement le DIU	0,024	0,005	984	653	1,056	0,213	0,014	0,035
Utilise actuellement les injections	0,034	0,006	984	653	1,088	0,186	0,021	0,046
Utilise actuellement le Norplant	0,010	0,003	984	653	0,972	0,309	0,004	0,016
Utilise actuellement le condom	0,039	0,006	984	653	0,986	0,156	0,027	0,051
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,006	0,002	984	653	0,988	0,418	0,001	0,010
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	984	653	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,087	0,010	984	653	1,104	0,114	0,067	0,107
Utilise actuellement le retrait	0,004	0,002	984	653	1,015	0,516	0,000	0,008
Utilise source publique	0,504	0,032	332	214	1,156	0,063	0,441	0,568
Ne veut plus d'enfants	0,257	0,013	984	653	0,962	0,052	0,230	0,284
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,405	0,017	984	653	1,092	0,042	0,371	0,439
Taille de famille idéale	4,173	0,059	1477	971	1,389	0,014	4,055	4,292
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,822	0,017	935	612	1,254	0,020	0,789	0,856
Assistance médicale à l'accouchement	0,902	0,014	935	612	1,226	0,015	0,874	0,929
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,192	0,015	843	555	1,051	0,076	0,163	0,222
A reçu traitement SRO	0,351	0,036	166	107	0,927	0,101	0,280	0,423
A consulté du personnel médical	0,395	0,034	166	107	0,860	0,087	0,326	0,463
Ayant une carte de santé	0,875	0,030	164	107	1,150	0,034	0,816	0,935
A reçu vaccination BCG	0,964	0,015	164	107	1,022	0,015	0,935	0,994
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,716	0,038	164	107	1,083	0,054	0,639	0,792
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,716	0,037	164	107	1,045	0,052	0,642	0,790
A reçu vaccination rougeole	0,755	0,035	164	107	1,039	0,046	0,685	0,825
Vacciné contre toutes les maladies	0,578	0,048	164	107	1,225	0,082	0,483	0,673
Poids-pour-taille	0,096	0,011	718	469	1,033	0,118	0,073	0,118
Taille-pour-âge	0,227	0,016	718	469	1,017	0,072	0,195	0,260
Poids-pour-âge	0,223	0,018	718	469	1,139	0,082	0,186	0,259
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	4,052	0,155	NA	4617	1,418	0,038	3,742	4,361
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	30,893	4,220	1860	1230	0,995	0,137	22,452	39,334
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	67,396	5,379	1864	1232	0,871	0,080	56,638	78,153
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	66,216	5,918	1881	1243	0,943	0,089	54,380	78,052
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	129,149	7,742	1885	1245	0,935	0,060	113,665	144,634
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	36,503	3,601	1864	1232	0,822	0,099	29,300	43,706
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	798	581	NA	0,000	1,000	1,000
Sans instruction	0,341	0,026	798	581	1,529	0,075	0,289	0,392
Instruction post-primaire ou plus	0,444	0,034	798	581	1,910	0,076	0,377	0,512
Jamais mariée (en union)	0,554	0,021	798	581	1,201	0,038	0,512	0,597
Actuellement mariée (en union)	0,413	0,020	798	581	1,152	0,049	0,373	0,454
Connaît une méthode contraceptive	0,991	0,005	332	240	0,970	0,005	0,982	1,000
Connaît une méthode moderne	0,989	0,006	332	240	0,958	0,006	0,978	1,000
A utilisé une méthode	0,805	0,029	332	240	1,349	0,037	0,746	0,863
Utilise actuellement une méthode	0,578	0,032	332	240	1,181	0,055	0,514	0,642
Utilise actuellement une méthode moderne	0,294	0,026	332	240	1,036	0,088	0,242	0,346
Utilise actuellement la pilule	0,085	0,013	332	240	0,855	0,154	0,059	0,112
Utilise actuellement le DIU	0,025	0,011	332	240	1,302	0,443	0,003	0,048
Utilise actuellement les injections	0,024	0,010	332	240	1,170	0,412	0,004	0,043
Utilise actuellement le Norplant	0,016	0,008	332	240	1,099	0,470	0,001	0,032
Utilise actuellement le condom	0,137	0,019	332	240	1,014	0,140	0,099	0,176
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,003	0,003	332	240	1,018	0,998	0,000	0,009
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	332	240	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,264	0,028	332	240	1,138	0,104	0,209	0,320
Utilise actuellement le retrait	0,008	0,006	332	240	1,233	0,740	0,000	0,021
Ne veut plus d'enfants	0,295	0,022	332	240	0,889	0,076	0,250	0,340
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,370	0,023	332	240	0,882	0,063	0,324	0,417
Taille de famille idéale	4,416	0,135	725	529	1,127	0,031	4,146	4,686

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.4 Erreurs de sondage - Échantillon rural, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	4794	5359	NA	NA	0,000	0,000
Sans instruction	0,937	0,006	4794	5359	1,759	0,007	0,925	0,949
Instruction post-primaire ou plus	0,006	0,001	4794	5359	1,309	0,240	0,003	0,009
Jamais mariée (en union)	0,132	0,007	4794	5359	1,332	0,049	0,119	0,145
Actuellement mariée (en union)	0,845	0,007	4794	5359	1,313	0,008	0,831	0,859
Mariée (en union) avant 20 ans	0,891	0,007	3785	4225	1,414	0,008	0,876	0,905
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,707	0,010	3785	4225	1,287	0,013	0,688	0,726
Enfants nés vivants	3,822	0,045	4794	5359	0,986	0,012	3,733	3,911
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,593	0,104	869	962	1,185	0,014	7,385	7,801
Enfants survivants	2,869	0,030	4794	5359	0,882	0,011	2,809	2,930
Connaît une méthode contraceptive	0,765	0,016	4050	4528	2,371	0,021	0,734	0,797
Connaît une méthode moderne	0,743	0,016	4050	4528	2,338	0,022	0,711	0,775
A utilisé une méthode	0,205	0,013	4050	4528	2,113	0,065	0,178	0,232
Utilise actuellement une méthode	0,093	0,008	4050	4528	1,806	0,088	0,077	0,110
Utilise actuellement une méthode moderne	0,026	0,004	4050	4528	1,470	0,141	0,019	0,034
Utilise actuellement la pilule	0,009	0,002	4050	4528	1,323	0,219	0,005	0,013
Utilise actuellement le DIU	0,001	0,001	4050	4528	1,258	0,614	0,000	0,002
Utilise actuellement les injections	0,007	0,001	4050	4528	1,085	0,197	0,005	0,010
Utilise actuellement le Norplant	0,001	0,000	4050	4528	1,011	0,530	0,000	0,002
Utilise actuellement le condom	0,008	0,002	4050	4528	1,106	0,197	0,005	0,011
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	4050	4528	0,853	1,000	0,000	0,001
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	4050	4528	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,040	0,005	4050	4528	1,626	0,125	0,030	0,050
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	4050	4528	1,021	0,352	0,001	0,004
Utilise source publique	0,564	0,042	148	161	1,034	0,075	0,479	0,648
Ne veut plus d'enfants	0,187	0,008	4050	4528	1,377	0,045	0,170	0,203
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,450	0,010	4050	4528	1,313	0,023	0,429	0,470
Taille de famille idéale	6,076	0,087	3683	4120	2,145	0,014	5,902	6,251
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,504	0,020	5018	5605	2,338	0,039	0,464	0,543
Assistance médicale à l'accouchement	0,245	0,020	5018	5605	2,815	0,083	0,204	0,285
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,200	0,009	4233	4731	1,445	0,046	0,182	0,219
A reçu traitement SRO	0,123	0,012	849	948	1,004	0,096	0,100	0,147
A consulté du personnel médical	0,166	0,014	849	948	1,081	0,085	0,138	0,195
Ayant une carte de santé	0,522	0,031	837	934	1,739	0,059	0,461	0,584
A reçu vaccination BCG	0,695	0,027	837	934	1,704	0,040	0,640	0,750
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,328	0,028	837	934	1,664	0,084	0,273	0,383
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,391	0,026	837	934	1,500	0,066	0,339	0,443
A reçu vaccination rougeole	0,423	0,026	837	934	1,505	0,062	0,371	0,476
Vacciné contre toutes les maladies	0,241	0,024	837	934	1,569	0,099	0,193	0,289
Poids-pour-taille	0,137	0,008	2972	3322	1,272	0,059	0,120	0,153
Taille-pour-âge	0,388	0,010	2972	3322	1,093	0,026	0,368	0,408
Poids-pour-âge	0,360	0,010	2972	3322	1,089	0,027	0,341	0,380
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,308	0,095	NA	23803	1,105	0,013	7,118	7,499
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	45,065	2,463	9983	11139	1,072	0,055	40,138	49,992
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	113,180	4,347	10000	11158	1,243	0,038	104,485	121,875
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	137,084	5,443	10203	11385	1,282	0,040	126,198	147,971
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	234,749	6,727	10220	11405	1,416	0,029	221,295	248,202
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	68,115	3,456	10000	11158	1,268	0,051	61,204	75,026
HOMMES								
Milieu urbain	0,000	0,000	1843	2060	NA	NA	0,000	0,000
Sans instruction	0,846	0,013	1843	2060	1,523	0,015	0,821	0,872
Instruction post-primaire ou plus	0,033	0,005	1843	2060	1,276	0,160	0,023	0,044
Jamais mariée (en union)	0,370	0,013	1843	2060	1,154	0,035	0,344	0,396
Actuellement mariée (en union)	0,614	0,013	1843	2060	1,130	0,021	0,588	0,640
Connaît une méthode contraceptive	0,923	0,011	1126	1265	1,361	0,012	0,902	0,945
Connaît une méthode moderne	0,910	0,011	1126	1265	1,336	0,013	0,887	0,933
A utilisé une méthode	0,526	0,028	1126	1265	1,891	0,054	0,470	0,582
Utilise actuellement une méthode	0,360	0,026	1126	1265	1,784	0,071	0,309	0,411
Utilise actuellement une méthode moderne	0,102	0,012	1126	1265	1,304	0,115	0,078	0,125
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,004	1126	1265	1,069	0,233	0,010	0,027
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	1126	1265	1,029	0,710	0,000	0,005
Utilise actuellement les injections	0,005	0,002	1126	1265	0,981	0,413	0,001	0,009
Utilise actuellement le Norplant	0,001	0,001	1126	1265	0,839	0,996	0,000	0,002
Utilise actuellement le condom	0,073	0,009	1126	1265	1,211	0,128	0,054	0,092
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	1126	1265	1,022	0,997	0,000	0,003
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,001	0,001	1126	1265	1,030	1,005	0,000	0,003
Utilise la continence périodique	0,228	0,021	1126	1265	1,673	0,092	0,186	0,270
Utilise actuellement le retrait	0,005	0,002	1126	1265	1,034	0,450	0,000	0,009
Ne veut plus d'enfants	0,067	0,009	1126	1265	1,173	0,130	0,050	0,085
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,537	0,019	1126	1265	1,289	0,036	0,498	0,575
Taille de famille idéale	7,784	0,171	1517	1696	1,315	0,022	7,442	8,127

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.5 Erreurs de sondage - Ville de Ouagadougou, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	963	544	NA	0,000	1,000	1,000
Sans instruction	0,413	0,031	963	544	1,979	0,076	0,350	0,476
Instruction post-primaire ou plus	0,353	0,029	963	544	1,891	0,083	0,295	0,411
Jamais mariée (en union)	0,344	0,021	963	544	1,340	0,060	0,303	0,385
Actuellement mariée (en union)	0,587	0,021	963	544	1,310	0,035	0,545	0,628
Mariée (en union) avant 20 ans	0,569	0,026	708	400	1,370	0,045	0,518	0,620
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,429	0,026	708	400	1,371	0,059	0,378	0,480
Enfants nés vivants	2,239	0,095	963	544	1,133	0,042	2,049	2,429
Enfants nés vivants des femmes 40-49	6,522	0,218	115	65	0,915	0,033	6,086	6,957
Enfants survivants	1,895	0,072	963	544	1,033	0,038	1,751	2,039
Connaît une méthode contraceptive	0,988	0,005	565	319	1,000	0,005	0,978	0,997
Connaît une méthode moderne	0,988	0,005	565	319	1,000	0,005	0,978	0,997
A utilisé une méthode	0,632	0,030	565	319	1,482	0,048	0,572	0,692
Utilise actuellement une méthode	0,322	0,029	565	319	1,487	0,091	0,264	0,381
Utilise actuellement une méthode moderne	0,225	0,025	565	319	1,447	0,113	0,174	0,276
Utilise actuellement la pilule	0,060	0,012	565	319	1,199	0,199	0,036	0,084
Utilise actuellement le DIU	0,028	0,007	565	319	0,940	0,232	0,015	0,041
Utilise actuellement les injections	0,041	0,009	565	319	1,109	0,227	0,022	0,059
Utilise actuellement le Norplant	0,016	0,005	565	319	1,007	0,333	0,005	0,027
Utilise actuellement le condom	0,069	0,012	565	319	1,094	0,169	0,046	0,092
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,007	0,004	565	319	1,031	0,514	0,000	0,014
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	565	319	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,094	0,013	565	319	1,097	0,144	0,067	0,121
Utilise actuellement le retrait	0,004	0,003	565	319	1,040	0,735	0,002	0,009
Utilise source publique	0,414	0,029	210	119	0,851	0,070	0,356	0,472
Ne veut plus d'enfants	0,278	0,021	565	319	1,128	0,077	0,235	0,320
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,409	0,022	565	319	1,072	0,054	0,364	0,453
Taille de famille idéale	4,036	0,086	845	477	1,633	0,021	3,864	4,207
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,834	0,019	561	317	1,105	0,022	0,797	0,872
Assistance médicale à l'accouchement	0,941	0,012	561	317	0,984	0,013	0,918	0,965
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,207	0,015	503	284	0,808	0,072	0,177	0,236
A reçu traitement SRO	0,423	0,039	104	59	0,781	0,092	0,346	0,501
A consulté du personnel médical	0,442	0,042	104	59	0,820	0,094	0,359	0,526
Ayant une carte de santé	0,939	0,030	98	55	1,218	0,031	0,880	0,998
A reçu vaccination BCG	0,969	0,019	98	55	1,068	0,019	0,932	1,000
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,847	0,043	98	55	1,177	0,051	0,761	0,933
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,847	0,046	98	55	1,252	0,054	0,756	0,938
A reçu vaccination rougeole	0,857	0,042	98	55	1,186	0,049	0,773	0,941
Vacciné contre toutes les maladies	0,745	0,067	98	55	1,522	0,090	0,610	0,880
Poids-pour-taille	0,103	0,014	436	246	0,983	0,140	0,074	0,132
Taille-pour-âge	0,209	0,022	436	246	1,139	0,107	0,164	0,253
Poids-pour-âge	0,209	0,026	436	246	1,311	0,123	0,157	0,260
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	4,079	0,210	NA	2354	1,299	0,051	3,659	4,498
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	33,488	5,066	1087	613	0,864	0,151	23,357	43,620
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	69,732	7,617	1089	615	0,936	0,109	54,498	84,966
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	68,211	8,001	1100	621	0,928	0,117	52,209	84,213
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	133,187	9,859	1102	622	0,881	0,074	113,468	152,905
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	36,244	5,011	1089	615	0,893	0,138	26,221	46,266
HOMMES								
Milieu urbain	1,000	0,000	452	294	NA	0,000	1,000	1,000
Sans instruction	0,316	0,028	452	294	1,284	0,089	0,260	0,373
Instruction post-primaire ou plus	0,469	0,034	452	294	1,451	0,073	0,401	0,537
Jamais mariée (en union)	0,551	0,025	452	294	1,070	0,045	0,501	0,601
Actuellement mariée (en union)	0,403	0,026	452	294	1,128	0,065	0,351	0,455
Connaît une méthode contraceptive	0,989	0,008	182	118	0,996	0,008	0,974	1,000
Connaît une méthode moderne	0,984	0,009	182	118	0,984	0,009	0,965	1,000
A utilisé une méthode	0,830	0,041	182	118	1,458	0,049	0,748	0,911
Utilise actuellement une méthode	0,582	0,042	182	118	1,136	0,071	0,499	0,666
Utilise actuellement une méthode moderne	0,346	0,034	182	118	0,962	0,098	0,278	0,414
Utilise actuellement la pilule	0,055	0,013	182	118	0,772	0,238	0,029	0,081
Utilise actuellement le DIU	0,027	0,015	182	118	1,224	0,541	0,000	0,057
Utilise actuellement les injections	0,016	0,010	182	118	1,050	0,603	0,000	0,036
Utilise actuellement le Norplant	0,033	0,015	182	118	1,163	0,468	0,002	0,064
Utilise actuellement le condom	0,209	0,028	182	118	0,932	0,135	0,152	0,265
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	182	118	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	182	118	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,225	0,036	182	118	1,164	0,160	0,153	0,298
Utilise actuellement le retrait	0,005	0,005	182	118	0,997	0,997	0,000	0,016
Ne veut plus d'enfants	0,291	0,026	182	118	0,770	0,089	0,239	0,343
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,313	0,033	182	118	0,965	0,106	0,247	0,380
Taille de famille idéale	3,961	0,150	408	265	1,266	0,038	3,662	4,260

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.6 Erreurs de sondage - Nord, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,089	0,016	847	904	1,650	0,182	0,056	0,121
Sans instruction	0,886	0,017	847	904	1,525	0,019	0,853	0,920
Instruction post-primaire ou plus	0,038	0,018	847	904	2,708	0,469	0,002	0,073
Jamais mariée (en union)	0,150	0,016	847	904	1,279	0,105	0,119	0,181
Actuellement mariée (en union)	0,823	0,014	847	904	1,067	0,017	0,795	0,851
Mariée (en union) avant 20 ans	0,875	0,019	648	692	1,442	0,021	0,837	0,912
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,715	0,023	648	692	1,278	0,032	0,670	0,760
Enfants nés vivants	3,617	0,120	847	904	1,112	0,033	3,377	3,857
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,586	0,281	133	142	1,283	0,037	7,025	8,148
Enfants survivants	2,798	0,075	847	904	0,880	0,027	2,648	2,948
Connaît une méthode contraceptive	0,794	0,036	691	745	2,318	0,045	0,723	0,866
Connaît une méthode moderne	0,765	0,038	691	745	2,362	0,050	0,689	0,841
A utilisé une méthode	0,249	0,025	691	745	1,496	0,099	0,200	0,298
Utilise actuellement une méthode	0,094	0,012	691	745	1,118	0,132	0,069	0,119
Utilise actuellement une méthode moderne	0,030	0,008	691	745	1,287	0,277	0,014	0,047
Utilise actuellement la pilule	0,012	0,005	691	745	1,154	0,393	0,003	0,022
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	691	745	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement les injections	0,011	0,005	691	745	1,210	0,445	0,001	0,020
Utilise actuellement le Norplant	0,000	0,000	691	745	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,006	0,004	691	745	1,261	0,603	0,000	0,014
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	691	745	0,866	0,996	0,000	0,003
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	691	745	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,019	0,004	691	745	0,805	0,218	0,011	0,028
Utilise actuellement le retrait	0,003	0,002	691	745	0,993	0,673	0,000	0,007
Utilise source publique	0,681	0,080	32	32	0,955	0,117	0,521	0,841
Ne veut plus d'enfants	0,199	0,028	691	745	1,820	0,139	0,143	0,254
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,442	0,026	691	745	1,379	0,059	0,390	0,495
Taille de famille idéale	5,940	0,233	685	733	2,152	0,039	5,474	6,405
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,420	0,043	834	899	2,115	0,102	0,334	0,506
Assistance médicale à l'accouchement	0,245	0,045	834	899	2,509	0,183	0,155	0,335
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,217	0,020	694	751	1,285	0,093	0,177	0,257
A reçu traitement SRO	0,138	0,036	153	163	1,216	0,259	0,067	0,210
A consulté du personnel médical	0,207	0,042	153	163	1,208	0,202	0,123	0,290
Ayant une carte de santé	0,476	0,057	144	155	1,336	0,120	0,362	0,589
A reçu vaccination BCG	0,587	0,049	144	155	1,162	0,083	0,490	0,685
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,283	0,041	144	155	1,062	0,144	0,201	0,364
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,324	0,044	144	155	1,108	0,136	0,236	0,412
A reçu vaccination rougeole	0,383	0,041	144	155	1,008	0,108	0,301	0,466
Vacciné contre toutes les maladies	0,201	0,033	144	155	1,000	0,167	0,134	0,268
Poids-pour-taille	0,166	0,021	402	438	1,110	0,127	0,124	0,208
Taille-pour-âge	0,367	0,031	402	438	1,233	0,084	0,305	0,428
Poids-pour-âge	0,368	0,020	402	438	0,829	0,055	0,327	0,409
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,996	0,233	NA	3955	1,253	0,033	6,529	7,462
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	47,452	4,521	1642	1770	0,762	0,095	38,409	56,495
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	98,374	7,831	1643	1771	0,962	0,080	82,712	114,036
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	151,905	15,169	1690	1821	1,482	0,100	121,566	182,243
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	235,336	17,947	1691	1823	1,547	0,076	199,442	271,229
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	50,922	6,546	1643	1771	1,150	0,129	37,830	64,015
HOMMES								
Milieu urbain	0,111	0,034	355	380	2,046	0,308	0,042	0,179
Sans instruction	0,756	0,036	355	380	1,568	0,047	0,684	0,828
Instruction post-primaire ou plus	0,072	0,038	355	380	2,737	0,524	0,000	0,147
Jamais mariée (en union)	0,422	0,030	355	380	1,152	0,072	0,362	0,483
Actuellement mariée (en union)	0,566	0,030	355	380	1,144	0,053	0,506	0,627
Connaît une méthode contraceptive	0,908	0,029	201	215	1,414	0,032	0,850	0,966
Connaît une méthode moderne	0,899	0,029	201	215	1,362	0,032	0,841	0,957
A utilisé une méthode	0,591	0,085	201	215	2,446	0,144	0,421	0,761
Utilise actuellement une méthode	0,472	0,076	201	215	2,156	0,161	0,319	0,624
Utilise actuellement une méthode moderne	0,117	0,029	201	215	1,254	0,243	0,060	0,174
Utilise actuellement la pilule	0,017	0,010	201	215	1,128	0,602	0,000	0,038
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	201	215	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement les injections	0,009	0,007	201	215	0,993	0,737	0,000	0,022
Utilise actuellement le Norplant	0,000	0,000	201	215	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,091	0,026	201	215	1,261	0,282	0,040	0,142
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	201	215	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	201	215	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,336	0,059	201	215	1,766	0,175	0,218	0,454
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	201	215	NA	NA	0,000	0,000
Ne veut plus d'enfants	0,096	0,022	201	215	1,052	0,228	0,052	0,140
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,476	0,035	201	215	0,986	0,073	0,407	0,546
Taille de famille idéale	7,393	0,422	305	326	1,709	0,057	6,549	8,237

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.7 Erreurs de sondage - Est, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,052	0,016	1588	1761	2,891	0,310	0,020	0,084
Sans instruction	0,919	0,010	1588	1761	1,449	0,011	0,899	0,939
Instruction post-primaire ou plus	0,021	0,006	1588	1761	1,674	0,290	0,009	0,033
Jamais mariée (en union)	0,140	0,012	1588	1761	1,385	0,086	0,116	0,164
Actuellement mariée (en union)	0,837	0,013	1588	1761	1,369	0,015	0,812	0,862
Mariée (en union) avant 20 ans	0,882	0,012	1239	1378	1,311	0,014	0,858	0,906
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,682	0,017	1239	1378	1,311	0,025	0,647	0,717
Enfants nés vivants	3,899	0,088	1588	1761	1,127	0,023	3,722	4,075
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,410	0,136	309	341	0,937	0,018	7,139	7,681
Enfants survivants	2,889	0,053	1588	1761	0,915	0,018	2,783	2,995
Connaît une méthode contraceptive	0,714	0,036	1321	1474	2,892	0,050	0,642	0,786
Connaît une méthode moderne	0,699	0,035	1321	1474	2,813	0,051	0,628	0,770
A utilisé une méthode	0,152	0,029	1321	1474	2,901	0,189	0,094	0,209
Utilise actuellement une méthode	0,077	0,020	1321	1474	2,764	0,263	0,037	0,118
Utilise actuellement une méthode moderne	0,026	0,007	1321	1474	1,588	0,269	0,012	0,040
Utilise actuellement la pilule	0,007	0,003	1321	1474	1,137	0,379	0,002	0,012
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,002	1321	1474	1,496	0,705	0,000	0,008
Utilise actuellement les injections	0,006	0,002	1321	1474	0,957	0,351	0,002	0,010
Utilise actuellement le Norplant	0,002	0,001	1321	1474	1,099	0,758	0,000	0,004
Utilise actuellement le condom	0,007	0,003	1321	1474	1,169	0,385	0,002	0,012
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	1321	1474	0,800	1,000	0,000	0,001
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	1321	1474	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,024	0,011	1321	1474	2,708	0,477	0,001	0,047
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	1321	1474	1,028	0,578	0,000	0,005
Utilise source publique	0,570	0,080	50	52	1,132	0,141	0,410	0,730
Ne veut plus d'enfants	0,172	0,010	1321	1474	0,983	0,059	0,151	0,192
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,503	0,017	1321	1474	1,253	0,034	0,469	0,538
Taille de famille idéale	6,323	0,124	1289	1424	1,876	0,020	6,076	6,571
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,521	0,033	1637	1833	2,259	0,064	0,454	0,588
Assistance médicale à l'accouchement	0,311	0,031	1637	1833	2,296	0,100	0,249	0,374
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,156	0,011	1407	1576	1,096	0,070	0,134	0,178
A reçu traitement SRO	0,186	0,031	217	245	1,152	0,165	0,125	0,247
A consulté du personnel médical	0,174	0,025	217	245	0,968	0,144	0,124	0,224
Ayant une carte de santé	0,478	0,055	267	298	1,779	0,116	0,367	0,588
A reçu vaccination BCG	0,676	0,054	267	298	1,860	0,079	0,569	0,784
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,313	0,056	267	298	1,901	0,178	0,202	0,425
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,390	0,042	267	298	1,360	0,106	0,307	0,474
A reçu vaccination rougeole	0,379	0,045	267	298	1,474	0,119	0,289	0,469
Vacciné contre toutes les maladies	0,235	0,045	267	298	1,654	0,191	0,145	0,325
Poids-pour-taille	0,124	0,013	804	896	1,067	0,101	0,099	0,149
Taille-pour-âge	0,355	0,019	804	896	1,080	0,052	0,318	0,392
Poids-pour-âge	0,329	0,012	804	896	0,700	0,036	0,305	0,353
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,322	0,211	NA	7814	1,475	0,029	6,899	7,745
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	41,790	3,927	3282	3669	1,014	0,094	33,936	49,644
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	107,791	8,374	3287	3675	1,407	0,078	91,044	124,539
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	142,141	8,873	3363	3760	1,114	0,062	124,395	159,886
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	234,610	12,634	3368	3766	1,535	0,054	209,342	259,879
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	66,001	7,713	3287	3675	1,611	0,117	50,574	81,428
HOMMES								
Milieu urbain	0,077	0,024	661	729	2,320	0,312	0,029	0,125
Sans instruction	0,789	0,026	661	729	1,627	0,033	0,737	0,840
Instruction post-primaire ou plus	0,081	0,022	661	729	2,057	0,270	0,037	0,125
Jamais mariée (en union)	0,396	0,027	661	729	1,393	0,067	0,343	0,449
Actuellement mariée (en union)	0,584	0,025	661	729	1,294	0,042	0,535	0,634
Connaît une méthode contraceptive	0,858	0,025	381	426	1,372	0,029	0,809	0,908
Connaît une méthode moderne	0,847	0,025	381	426	1,351	0,029	0,798	0,897
A utilisé une méthode	0,431	0,049	381	426	1,939	0,114	0,332	0,529
Utilise actuellement une méthode	0,328	0,051	381	426	2,137	0,157	0,225	0,431
Utilise actuellement une méthode moderne	0,084	0,022	381	426	1,570	0,266	0,039	0,129
Utilise actuellement la pilule	0,009	0,005	381	426	1,081	0,579	0,000	0,020
Utilise actuellement le DIU	0,000	0,000	381	426	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement les injections	0,003	0,003	381	426	1,036	1,008	0,000	0,008
Utilise actuellement le Norplant	0,002	0,002	381	426	0,833	0,987	0,000	0,006
Utilise actuellement le condom	0,063	0,018	381	426	1,433	0,284	0,027	0,099
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,003	381	426	0,944	0,717	0,000	0,011
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,003	0,003	381	426	1,042	1,013	0,000	0,008
Utilise la continence périodique	0,177	0,039	381	426	2,011	0,222	0,098	0,256
Utilise actuellement le retrait	0,009	0,005	381	426	1,073	0,587	0,000	0,019
Ne veut plus d'enfants	0,083	0,015	381	426	1,064	0,181	0,053	0,113
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,493	0,032	381	426	1,249	0,065	0,429	0,557
Taille de famille idéale	7,287	0,219	577	636	1,123	0,030	6,849	7,725

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.8 Erreurs de sondage - Ouest, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,210	0,019	1453	1489	1,738	0,089	0,173	0,247
Sans instruction	0,862	0,013	1453	1489	1,467	0,015	0,835	0,889
Instruction post-primaire ou plus	0,056	0,011	1453	1489	1,833	0,198	0,034	0,078
Jamais mariée (en union)	0,164	0,012	1453	1489	1,263	0,075	0,140	0,189
Actuellement mariée (en union)	0,810	0,013	1453	1489	1,258	0,016	0,784	0,836
Mariée (en union) avant 20 ans	0,803	0,015	1115	1150	1,288	0,019	0,772	0,834
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,697	0,015	1115	1150	1,089	0,021	0,667	0,727
Enfants nés vivants	3,434	0,065	1453	1489	0,809	0,019	3,304	3,565
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,441	0,276	225	233	1,399	0,037	6,889	7,994
Enfants survivants	2,679	0,055	1453	1489	0,858	0,020	2,570	2,789
Connaît une méthode contraceptive	0,816	0,018	1151	1206	1,613	0,023	0,779	0,853
Connaît une méthode moderne	0,806	0,020	1151	1206	1,741	0,025	0,765	0,846
A utilisé une méthode	0,205	0,014	1151	1206	1,188	0,069	0,176	0,233
Utilise actuellement une méthode	0,088	0,008	1151	1206	0,964	0,092	0,072	0,104
Utilise actuellement une méthode moderne	0,051	0,007	1151	1206	1,106	0,141	0,036	0,065
Utilise actuellement la pilule	0,029	0,005	1151	1206	0,980	0,168	0,019	0,038
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,001	1151	1206	0,786	0,392	0,001	0,006
Utilise actuellement les injections	0,008	0,003	1151	1206	1,108	0,371	0,002	0,013
Utilise actuellement le Norplant	0,001	0,001	1151	1206	0,858	0,710	0,000	0,003
Utilise actuellement le condom	0,008	0,003	1151	1206	1,198	0,388	0,002	0,015
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,001	0,001	1151	1206	0,829	1,004	0,000	0,002
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	1151	1206	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,029	0,005	1151	1206	0,961	0,165	0,019	0,038
Utilise actuellement le retrait	0,003	0,002	1151	1206	0,953	0,501	0,000	0,006
Utilise source publique	0,636	0,055	98	83	1,124	0,086	0,526	0,745
Ne veut plus d'enfants	0,206	0,019	1151	1206	1,611	0,093	0,168	0,245
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,436	0,017	1151	1206	1,169	0,039	0,402	0,471
Taille de famille idéale	5,218	0,133	1226	1237	2,120	0,025	4,952	5,484
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,506	0,034	1358	1444	2,153	0,068	0,437	0,574
Assistance médicale à l'accouchement	0,277	0,032	1358	1444	2,229	0,115	0,213	0,341
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,250	0,020	1192	1267	1,618	0,082	0,209	0,291
A reçu traitement SRO	0,097	0,016	293	317	0,949	0,169	0,064	0,130
A consulté du personnel médical	0,130	0,021	293	317	1,091	0,161	0,088	0,172
Ayant une carte de santé	0,550	0,059	250	267	1,907	0,108	0,432	0,669
A reçu vaccination BCG	0,717	0,050	250	267	1,792	0,070	0,616	0,817
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,282	0,048	250	267	1,724	0,171	0,186	0,379
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,337	0,049	250	267	1,678	0,147	0,238	0,436
A reçu vaccination rougeole	0,436	0,047	250	267	1,522	0,108	0,342	0,530
Vacciné contre toutes les maladies	0,184	0,035	250	267	1,442	0,189	0,114	0,253
Poids-pour-taille	0,117	0,014	980	1038	1,370	0,119	0,089	0,145
Taille-pour-âge	0,400	0,020	980	1038	1,274	0,051	0,359	0,441
Poids-pour-âge	0,362	0,023	980	1038	1,505	0,063	0,316	0,408
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	6,677	0,240	NA	6588	1,307	0,036	6,198	7,156
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	44,470	4,633	2681	2855	1,115	0,104	35,203	53,737
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	112,240	8,152	2691	2865	1,246	0,073	95,936	128,544
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	101,014	8,845	2719	2895	1,270	0,088	83,323	118,704
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	201,916	12,080	2729	2906	1,424	0,060	177,755	226,076
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	67,770	5,754	2691	2865	1,124	0,085	56,262	79,279
HOMMES								
Milieu urbain	0,237	0,023	626	646	1,341	0,096	0,191	0,282
Sans instruction	0,755	0,027	626	646	1,541	0,035	0,702	0,808
Instruction post-primaire ou plus	0,119	0,023	626	646	1,776	0,193	0,073	0,165
Jamais mariée (en union)	0,356	0,019	626	646	0,996	0,054	0,318	0,394
Actuellement mariée (en union)	0,625	0,020	626	646	1,040	0,032	0,584	0,665
Connaît une méthode contraceptive	0,966	0,013	383	403	1,390	0,013	0,940	0,992
Connaît une méthode moderne	0,955	0,014	383	403	1,347	0,015	0,927	0,984
A utilisé une méthode	0,494	0,040	383	403	1,572	0,081	0,414	0,574
Utilise actuellement une méthode	0,246	0,030	383	403	1,352	0,121	0,186	0,305
Utilise actuellement une méthode moderne	0,106	0,015	383	403	0,958	0,142	0,076	0,136
Utilise actuellement la pilule	0,045	0,007	383	403	0,621	0,146	0,032	0,058
Utilise actuellement le DIU	0,010	0,006	383	403	1,153	0,587	0,000	0,022
Utilise actuellement les injections	0,009	0,005	383	403	1,086	0,595	0,000	0,019
Utilise actuellement le Norplant	0,000	0,000	383	403	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,040	0,011	383	403	1,062	0,268	0,018	0,061
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	383	403	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	383	403	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,126	0,026	383	403	1,535	0,207	0,074	0,178
Utilise actuellement le retrait	0,009	0,005	383	403	1,059	0,576	0,000	0,019
Ne veut plus d'enfants	0,111	0,020	383	403	1,215	0,176	0,072	0,150
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,495	0,038	383	403	1,476	0,076	0,419	0,570
Taille de famille idéale	7,178	0,259	523	533	1,074	0,036	6,661	7,696

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

Tableau B.9 Erreurs de sondage - Centre/Sud, EDSBF-II Burkina Faso 1998-99

Variable	Valeur (M)	Erreur type (ET)	Population de base		Effet de grappe (REPS)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance	
			Non pondérée (N)	Pondérée (N _N)			M-2ET	M+2ET
FEMMES								
Milieu urbain	0,034	0,006	1594	1748	1,264	0,170	0,022	0,045
Sans instruction	0,917	0,016	1594	1748	2,294	0,017	0,886	0,949
Instruction post-primaire ou plus	0,016	0,004	1594	1748	1,367	0,265	0,008	0,025
Jamais mariée (en union)	0,156	0,012	1594	1748	1,363	0,079	0,131	0,181
Actuellement mariée (en union)	0,823	0,014	1594	1748	1,487	0,017	0,795	0,852
Mariée (en union) avant 20 ans	0,909	0,014	1261	1383	1,770	0,016	0,880	0,938
Premiers rapports sexuels avant 18 ans	0,705	0,018	1261	1383	1,435	0,026	0,668	0,742
Enfants nés vivants	3,731	0,074	1594	1748	0,939	0,020	3,584	3,879
Enfants nés vivants des femmes 40-49	7,546	0,165	296	323	1,169	0,022	7,216	7,877
Enfants survivants	2,776	0,053	1594	1748	0,885	0,019	2,670	2,883
Connaît une méthode contraceptive	0,808	0,023	1306	1439	2,065	0,028	0,763	0,853
Connaît une méthode moderne	0,775	0,024	1306	1439	2,051	0,031	0,727	0,822
A utilisé une méthode	0,307	0,027	1306	1439	2,104	0,088	0,253	0,360
Utilise actuellement une méthode	0,155	0,015	1306	1439	1,526	0,099	0,124	0,185
Utilise actuellement une méthode moderne	0,040	0,008	1306	1439	1,498	0,204	0,024	0,056
Utilise actuellement la pilule	0,015	0,005	1306	1439	1,386	0,307	0,006	0,025
Utilise actuellement le DIU	0,002	0,001	1306	1439	1,032	0,707	0,000	0,004
Utilise actuellement les injections	0,012	0,003	1306	1439	0,999	0,250	0,006	0,018
Utilise actuellement le Norplant	0,001	0,001	1306	1439	0,871	0,716	0,000	0,003
Utilise actuellement le condom	0,010	0,002	1306	1439	0,912	0,257	0,005	0,014
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	1306	1439	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	1306	1439	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,086	0,010	1306	1439	1,244	0,112	0,067	0,106
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	1306	1439	1,063	1,030	0,000	0,002
Utilise source publique	0,508	0,061	90	91	1,155	0,120	0,386	0,631
Ne veut plus d'enfants	0,191	0,012	1306	1439	1,086	0,062	0,168	0,215
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,398	0,019	1306	1439	1,372	0,047	0,361	0,436
Taille de famille idéale	6,023	0,171	1115	1220	2,328	0,028	5,681	6,365
Naissances pour lesquelles la mère a reçu une injection antitétanique	0,580	0,040	1563	1725	2,704	0,068	0,500	0,659
Assistance médicale à l'accouchement	0,252	0,047	1563	1725	3,628	0,187	0,158	0,347
Diarrhée dans les 2 dernières semaines	0,192	0,017	1280	1409	1,504	0,088	0,159	0,226
A reçu traitement SRO	0,113	0,017	248	271	0,797	0,152	0,079	0,147
A consulté du personnel médical	0,207	0,027	248	271	0,995	0,128	0,154	0,261
Ayant une carte de santé	0,628	0,050	242	266	1,585	0,079	0,529	0,727
A reçu vaccination BCG	0,808	0,045	242	266	1,767	0,056	0,719	0,898
A reçu vaccination DTC (3 doses)	0,465	0,049	242	266	1,505	0,105	0,367	0,563
A reçu vaccination polio (3 doses)	0,521	0,052	242	266	1,588	0,099	0,418	0,625
A reçu vaccination rougeole	0,527	0,052	242	266	1,606	0,099	0,423	0,632
Vacciné contre toutes les maladies	0,359	0,051	242	266	1,632	0,143	0,256	0,462
Poids-pour-taille	0,143	0,015	1068	1172	1,444	0,108	0,112	0,174
Taille-pour-âge	0,384	0,014	1068	1172	0,952	0,037	0,355	0,412
Poids-pour-âge	0,357	0,016	1068	1172	1,070	0,045	0,325	0,389
Indice synthétique de fécondité (5 ans)	7,057	0,182	NA	7711	1,082	0,026	6,692	7,422
Quotient de mortalité néonatale (10 ans)	44,818	5,409	3151	3462	1,320	0,121	34,000	55,636
Quotient de mortalité infantile (10 ans) ¹	118,679	8,190	3154	3465	1,282	0,069	102,298	135,059
Quotient de mortalité juvénile (10 ans) ¹	139,136	9,817	3212	3531	1,312	0,071	119,501	158,770
Quotient de mortalité infanto-juvénile (10 ans) ¹	241,302	11,902	3215	3534	1,382	0,049	217,498	265,106
Quotient de mortalité post-néonatale (10 ans) ¹	73,861	5,267	3154	3465	1,055	0,071	63,326	84,396
HOMMES								
Milieu urbain	0,061	0,008	547	593	0,749	0,126	0,046	0,076
Sans instruction	0,842	0,026	547	593	1,637	0,030	0,791	0,893
Instruction post-primaire ou plus	0,044	0,007	547	593	0,842	0,168	0,029	0,059
Jamais mariée (en union)	0,412	0,027	547	593	1,281	0,066	0,358	0,466
Actuellement mariée (en union)	0,577	0,026	547	593	1,246	0,046	0,524	0,630
Connaît une méthode contraceptive	0,989	0,006	311	342	0,970	0,006	0,977	1,000
Connaît une méthode moderne	0,971	0,009	311	342	0,964	0,009	0,953	0,990
A utilisé une méthode	0,731	0,048	311	342	1,890	0,065	0,636	0,826
Utilise actuellement une méthode	0,543	0,046	311	342	1,634	0,085	0,450	0,635
Utilise actuellement une méthode moderne	0,160	0,026	311	342	1,268	0,165	0,107	0,213
Utilise actuellement la pilule	0,034	0,013	311	342	1,271	0,387	0,008	0,060
Utilise actuellement le DIU	0,003	0,003	311	342	1,044	1,008	0,000	0,010
Utilise actuellement les injections	0,010	0,005	311	342	0,887	0,497	0,000	0,020
Utilise actuellement le Norplant	0,000	0,000	311	342	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement le condom	0,113	0,019	311	342	1,073	0,171	0,074	0,151
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	311	342	NA	NA	0,000	0,000
Utilise actuellement la stérilisation masculine	0,000	0,000	311	342	NA	NA	0,000	0,000
Utilise la continence périodique	0,371	0,045	311	342	1,632	0,121	0,282	0,461
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	311	342	NA	NA	0,000	0,000
Ne veut plus d'enfants	0,059	0,016	311	342	1,224	0,277	0,027	0,092
Veut retarder d'au moins 2 ans	0,640	0,030	311	342	1,117	0,048	0,579	0,700
Taille de famille idéale	7,785	0,421	429	464	1,631	0,054	6,942	8,627

NA = Non-applicable

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période 0-9 ans précédant l'enquête.

REGROUPEMENT DES PROVINCES EN RÉGIONS DE RÉSIDENCE

Région	Province	Région	Province
Ouagadougou	Ville de Ouagadougou	Ouest	Bougouriba Comoé
Nord	Bam Oudalan Séno Soum Sourou Yatenga Loroum Nayala Zoundoma		Houet Kéné Dougou Kossi Mouhoun Poni Les Balés Banwa Ioba Léraba Noumbiel Tuy
Est	Boulgou Ganzourgou Gnagna Gourma Kouritenga Nahouri Namentenga Tapoa Zoundweogo Komandjari Kompienga Koulpelogo Yagha	Centre/Sud	Bazèga Boulkiemdé Kadiogo (rural) Oubritenga Passoré Sanguié Sanmatenga Sissili Kourweogo Ziro